

## Nachsorgeschema Malignes Melanom

| Untersuchungs-<br>intervalle/Jahr     |          | klinische<br>Untersuchung | regionäre LK-<br>Sonographie | CT-Hals/-Thorax/-Abdomen | MRT-Kopf    | S-100       |
|---------------------------------------|----------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| in situ Melanome<br>(pTis)            | 1.-10. J | 1x                        | -                            | -                        | -           | -           |
| Stadium Ia                            | 1.-3. J  | 2x                        | -                            | -                        | -           | -           |
|                                       | 4.-5. J  | 1x                        | -                            | -                        | -           | -           |
|                                       | 6.-10. J | 1x                        | -                            | -                        | -           | -           |
| Stadium Ib-IIb                        | 1.-3. J  | 4x                        | 2x*                          | -                        | -           | 4x          |
|                                       | 4.-5. J  | 2x                        | -                            | -                        | -           | -           |
|                                       | 6.-10. J | 2x                        | -                            | -                        | -           | -           |
| Stadium IIc-IV<br>(resezierbar)       | 1.-3. J  | 4x                        | 4x                           | 2x                       | 2x          | 4x          |
|                                       | 4.-5. J  | 4x                        | 2x                           | -                        | -           | 2x          |
|                                       | 6.-10. J | 2x                        | -                            | -                        | -           | -           |
| Stadium III/IV<br>(nicht resezierbar) | 1.-10. J | individuell               | individuell                  | individuell              | individuell | individuell |

- \* Nur bei korrektem pathologischen Staging mittels SLNB, sonst wie IIc
- Bei Melanoma in situ und Stadium Ia: Nachsorge beim Niedergelassenen Hautarzt empfohlen
- Malignes Melanom Stadium Ib-IIb: Alternierende Nachsorge zwischen Klinik und Niedergelassenem Hautarzt empfohlen

|                                  |                                |                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nachsorgeschema Malignes Melanom | Verteiler: Hautklinik-Intranet | Version 4                                                      |
| Gez. Loquai, 18.03.2013          | Gez. Loquai, 18.03.2013        | Gez. Loquai, 18.03.2013 / Gez. Grabbe, 18.03.2013              |
| Erstellt: Dr. C. Loquai, Datum   | Geprüft: Dr. C. Loquai, Datum  | Freigegeben: Dr. C. Loquai, Datum / Prof. Dr. S. Grabbe, Datum |