



! Wichtige Mitteilung des Zentrallabors !

die Bestimmung der ASCA-IgG und -IgA (Anti-Saccharomyces-cerevisiae-Antikörper) mittels ELISA wurde zum 01.09.2025 im Zentrallabor eingestellt.

Laut der neuen S3-Leitlinie der DGVS [1] ist die ASCA aufgrund der niedrigen Sensitivität für die Diagnosestellung und den routinemäßigen Einsatz nicht geeignet.

In Einzelfällen, z.B. bei einer nicht zu klassifizierenden Colitis, können die ASCA als externe Leistung bestimmt werden. Die ASCA-Antikörper finden Sie demnächst im Lauris bei den externen Anforderungen unter „Auto-Antikörper“.

[1] Sturm A, Atreya R, Bettenworth D, Bokemeyer B, Dignass A, Ehehalt R, Germer CT, Grunert PC, Helwig U, Horisberger K, Herrlinger K, Kienle P, Kucharzik T, Langhorst J, Maaser C, Ockenga J, Ott C, Siegmund B, Zeißig S, Stallmach A; Collaborators. Aktualisierte S3-Leitlinie „Diagnostik und Therapie des Morbus Crohn“ der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) (Version 4.1) – living guideline. Z Gastroenterol. 2024 Aug;62(8):1229-1318. German. doi: 10.1055/a-2309-6123. Epub 2024 Aug 7. PMID: 39111333.

Für nähere Informationen bitte Frau Dr. Marová (Tel.: 7092) oder den Dienstarzt (Tel. 2121) kontaktieren.

02-09-2025