

KINDERchirurgie

Kinder werden bei uns groß geschrieben.

Universitätsmedizin Mainz
Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie
Langenbeckstr. 1
55131 Mainz

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

auch nach der Anlage des Gipsverbandes kann es durch eine fortschreitende Schwellung dazu kommen, dass der Gips zu eng wird und es so zu Druck auf die Haut, die Nerven oder die Blutgefäße kommt.

Bitte beachten Sie folgende Zeichen:

- Verfärbung der Finger oder Zehen
- Unterschiede in der Hauttemperatur
- Kribbeln oder Taubheitsgefühl
- Schmerzen

Sollten diese Zeichen auftreten, ist es wichtig, sofort einen Arzt aufzusuchen. Sie können jederzeit in unsere Notaufnahme kommen. **Ein Kind im Gips hat IMMER Recht!**

Bitte denken Sie auch daran:

Bei Verletzungen an den Armen und an den Beinen ist es wichtig, sich zu schonen! Durch Hochlagern und Kühlen - auch durch den Gips - kann einer übermäßigen Schwellung vorgebeugt und Schmerzen gelindert werden. Auch Schmerzmittel wie Ibuprofen wirken neben der guten schmerzbekämpfenden Wirkung abschwellend. Indem Sie diese Regeln beachten, helfen Sie Ihrem Kind, schnell wieder fit zu sein.

Nach einiger Zeit werden die Schmerzen nachlassen und Ihr Kind wird sich wieder mehr bewegen, so dass es zu Schäden am Verband, wie Lockerung oder Gipsbruch, kommen kann. Bitte wenden Sie sich auch in diesem Fall an unsere Notaufnahme.

Wir wünschen gute Besserung.

Ihr Team der Kinderchirurgie

www.unimedizin-mainz.de/kinderchirurgie

