UNIVERSITÄTS**medizin.**
MAINZ

**Therapeutisches Drug Monitoring von
Psychofarmaka
Laboranalyse und Befundung**

**Univ.-Prof. Dr. C. Hiemke
Gudrun Hefner
Neurochemisches Labor**

10.05.2012

Inhalt der Vorlesung

Pre-TDM: Indication for TDM? - Availability of laboratory and pharmacological advice?

Fig. 1 Schematic overview of the TDM process as a guide for psychopharmacotherapy. Routine TDM is primarily applied to drugs with a narrow therapeutic index and a well-defined therapeutic reference range. However, TDM is useful for any psychotropic drug when addressing special therapeutic problems such as "therapy refractoriness" or side effects under recommended dosage.

Hiemke et al.; AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry: Update 2011; Pharmacopsychiatry 2011; 44: 195–235

Indikationen für TDM

Table 6 Typical indications for measuring plasma concentrations of medications in psychiatry.

- Dose optimization after initial prescription or after dose change
- Drugs, for which TDM is mandatory for safety reasons (e. g., lithium)
- Suspected complete or partial non-adherence (non-compliance) to medication
- Lack of clinical improvement under recommended doses
- Adverse effects and clinical improvement under recommended doses
- Combination treatment with a drug known for its interaction potential or suspected drug interaction
- TDM in pharmacovigilance programs
- Relapse prevention under maintenance treatment
- Recurrence under adequate doses
- Presence of a genetic particularity concerning drug metabolism (genetic deficiency, gene multiplication)
- Pregnant or breast feeding patient
- Children and adolescent patient
- Elderly patient (>65 y)
- Individuals with intellectual disabilities
- Patients with pharmacokinetically relevant comorbidities (hepatic or renal insufficiency, cardiovascular disease)
- Forensic patient
- Problems occurring after switching from an original preparation to a generic form (and vice versa)

Hiemke et al.;AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry: Update 2011; Pharmacopsychiatry 2011; 44: 195–235

1. Anforderung: Indikationen für TDM

TDM-Indikationen: Compliancekontrolle

Eckermann G, Maurer A, Heinze M, et al. 2006

- Forensischer Patient (48 Jahre)
 - § 63 StGB (Tötungsdelikt)
 - derzeit ausgesetzt
 - starker Raucher (≥ 10 Zigaretten/Tag)
 - Diagnose nach ICD-10: F20.0 - Paranoide Schizophrenie

- Medikation
 - Risperidon (oral) 4 - 0 - 0 - 4 mg (kein Depot)
 - **Keine Komedikation**

- In der Vergangenheit regelmäßige TDM-Kontrolle der Blutspiegel

- Therapeutischer Bereich Risperidon: 20 – 60 ng/ml

TDM-Indikationen: Compliancekontrolle

Datum	RIS Dosis (mg/d)	Spiegel (ng/ml)	Risperidon (Muttersubstanz) (ng/ml)	9 OH-RIS (akt. Metabolit) (ng/ml)
17.08.98	3 – 0 – 0	12	1	11
12.01.00	3 – 0 – 3	43	4	39
13.01.04	4 – 0 – 4 + Lorazepam 4mg	43	4	39
14.02.04	4 – 0 – 4	< 23	< 1	22
27.07.04	4 – 0 – 4	79	10	69
03.11.04	4 – 0 – 4	35	2	33
03.11.04	4 – 0 – 4	29	2	27
17.02.06	4 – 0 – 4	< 58	57	< 1
06.03.06	4 – 0 – 4	< 38	< 1	37

10.05.2012

Metabolische Ratio bei Risperidon

Fig. 2 Relationship between the *CYP2D6* genotype and the risperidone/9-OH-risperidone ratio. For abbreviations, see legend to Fig. 1

Kang et al. 2009

Scordo et al. 1999

Metabolische Ratio bei Risperidon

Table 2 Ranges of metabolite-to-parent concentration ratios for psychopharmacologic medications. Reported ranges contain 68% of ratios determined under "normal" conditions in the blood of patients or healthy subjects.

Drug	Metabolite	Ratios of concentrations metabolite: parent drug (Mean – SD – Mean + SD)	Reference
Perphenazine	N-Dealkylperphenazine	0.6–2.8 (n = 54)	[637]
Quetiapine	Norquetiapine	0.1–3.8 (n = 25) (calculated for 400 mg)	[723]
Reboxetine	O-Desethylreboxetine	<0.1	[484]
Risperidone	9-Hydroxyrisperidone*	EM or IM CYP2D6: 1.5–10.0 PM CYP2D6: ≤ 1	[159, 677]
Risperidone depot	9-Hydroxyrisperidone*	EM: 1.2–4.3	[469]
Sertindole	Dehydrosertindole	1.1–2.7 (n = 6) 1.0 in PM of CYP2D6	[729]
Sertraline	Norsertaline	1.7–3.4 (n = 348)	[546]
Trazodone	m-Chlorophenylpiperazine (mCPP)	0.04–0.22 (total range)	[328]
Trimipramine	Nortrimipramine*	0–12.0 (n = 17)	[142]
Venlafaxine	O-Desmethylvenlafaxine*	EM or IM CYP2D6: 0.3–5.2 PM CYP2D6: ≤ 0.3 UM CYP2D6: > 5.2	[592]
	N-Desmethylvenlafaxine	0.46–1.48	

* pharmacologically active metabolite, (*) active metabolite in vitro but unclear under in vivo conditions

When SD values of ranges of ratios (SD ratio) were not reported in the literature, SD ratios were calculated in accordance with Gaussian's law for the propagation of errors: SD ratio = $\frac{[(SD \text{ parent drug} \times \text{mean metabolite}) + (SD \text{ metabolite} \times \text{mean parent drug})]}{(\text{mean metabolite})^2}$

Prepared by CH, reviewed by Sonja Brünen, Christiane Knoth, Elnaz Ostad Haji and Viktoria Stieffenhofer

TDM-Indikationen: Compliancekontrolle

Datum	RIS Dosis (mg/d)	Spiegel (ng/ml)	Risperidon (Muttersubstanz) (ng/ml)	9 OH-RIS (akt. Metabolit) (ng/ml)
17.08.98	3 – 0 – 0	12	1	11
12.01.00	3 – 0 – 3	43	4	39
13.01.04	4 – 0 – 4 + Lorazepam 4mg	43	4	39
14.02.04	4 – 0 – 4	< 23	< 1	22
27.07.04	4 – 0 – 4	79	10	69
03.11.04	4 – 0 – 4	35	2	33
03.11.04	4 – 0 – 4	29	2	27
17.02.06	4 – 0 – 4	< 58	57	< 1
06.03.06	4 – 0 – 4	< 38	< 1	37

10.05.2012

TDM-Indikationen: Compliancekontrolle

Datum	RIS Dosis (mg/d)	Spiegel (ng/ml)	Risperidon (Muttersubstanz) (ng/ml)	9 OH-RIS (akt. Metabolit) (ng/ml)
17.08.98	3 – 0 – 0	12	1	11
12.01.00	3 – 0 – 0	43	4	39
13.01.04	4 – 0 – 4 + Lorazepam 4mg	43	4	39
14.02.04	4 – 0 – 4	43	4	22
27.07.04	4 – 0 – 4	43	4	69
03.11.04	4 – 0 – 4	35	2	33
03.11.04	4 – 0 – 4	29	2	27
17.02.06	4 – 0 – 4	< 58	57	< 1
06.03.06	4 – 0 – 4	< 38	< 1	37

CAVE: Der Patient ist NICHT compliant und hat somit seine Bewährungsaufgaben nicht erfüllt → er muss zurück in die forensische Psychiatrie

10.05.2012

1. Anforderung: Indikationen für TDM

1. Anforderung: Indikationen für TDM

1. Anforderung: Indikationen für TDM

1. Anforderung: Indikationen für TDM

AM-Interaktion

Schematische Darstellung pharmakodynamischer und pharmakokinetischer Arzneimittelinteraktionen (nach Haen)

PD = pharmakodynamisch; PK = pharmakokinetisch; PD2a beziehungsweise PD2b = agonistische beziehungsweise antagonistische Interaktion am Rezeptor; PD3a beziehungsweise PD3b = Addition/Potenzierung beziehungsweise Abschwächung/Aufhebung gleicher Wirkungen durch unterschiedliche Wirkstoffe; PK3a beziehungsweise PK3b = Förderung beziehungsweise Hemmung der Elimination durch Interaktion

AM-Interaktion

Table 1 Psychopharmacologic medications and enzymes involved in their metabolism.

Drug (active metabolite)	Enzymes	Reference
Acamprosate	not involved (not metabolized)	[578]
Agomelatine	CYP1A2, CYP2C19	[78]
Amantadine	merely involved (90% excreted unmetabolized)	[24]
Alprazolam	CYP3A4/5	[17, 496]
Amisulpride	merely involved (more than 90% is excreted unmetabolized via the kidney)	[566]
Amitriptyline and amitriptyline oxide (amitriptyline, nortriptyline)	CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4	[90, 650, 713]
Aripiprazole (dehydroaripiprazole)	CYP2D6, CYP3A4	[306, 701]
Asenapine	Glucuronosyltransferase and CYP1A2	[707]
Atomoxetine	CYP2D6	[446]
Benperidol	unclear	[589]
Benserazide	hydroxylation, COMT	[347]
Biperiden	hydroxylation	[628]
Bromocriptine	CYP3A4	[513]
Bromperidol	CYP3A4	[230, 633, 645, 736]
Brotizolam	CYP3A4	[655]
Buprenorphine (norbuprenorphine)	CYP2C8, CYP3A4	[79, 454]
Bupropion (hydroxybupropion)	CYP2B6	[309]
Buspirone	CYP3A4	[416]
Cabergoline	hydrolysis, CYP3A4	[167]
Carbidopa	unknown metabolic pathways 1/3 unmetabolized	[575]
Carbamazepine, CBZ (CBZ-10,11-epoxide)*	CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP3A4/5	[360, 497]

AM-Interaktion

Table 3 Inhibitors and inducers of enzymes involved in the metabolism of drug.

Inhibiting drugs	Inhibited enzymes	Inducing drugs	Induced enzymes
Amiodarone	CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4	Carbamazepine	CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP3A4
Bupropion	CYP2D6	Dexamethason	CYP2C9, CYP3A4
Bromocriptine	CYP3A4	Efavirenz	CYP2B6, CYP3A4
Chinidine	CYP2D6	Ethanol	CYP2E1
Cimetidin	CYP1A2, CYP2D6, CYP3A4	Ginkgo biloba	CYP2C19
Ciprofloxacin	CYP1A2	Isoniazide	CYP2E1
Clarithromycin	CYP3A4	St. John's wort	CYP2C19, CYP3A4
Clopidogrel	CYP2B6	Oxybutynin	CYP3A4
Disulfiram	CYP2E1	Phenobarbital	CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4
Duloxetine	CYP2D6	Phenytoin	CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4
Enoxacin	CYP1A2	Primidon	CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4
Erythromycin	CYP3A4	Smoke	CYP1A2
Esomeprazole	CYP2C19	Rifabutin	CYP3A4
Felbamate	CYP2C19	Rifampicin	CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19
Fluconazole	CYP2C19, CYP2C9, CYP3A4	Ritonavir	CYP3A4, CYP2C9, CYP3A4 (high dose)
Fluoxetine and norfluoxetine	CYP2D6, CYP2C19		
Fluvoxamine	CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4		
Indinavir	CYP3A4		
Isoniazid	CYP1A2, CYP2A6, CYP2C19, CYP3A4		
Itraconazol	CYP2B6, CYP3A4		
Ketoconazol	CYP3A4		
Levomepromazine	CYP2D6		
Melperone	CYP2D6		
Metoclopramide	CYP2D6		
Metoprolol	CYP2D6		
Miconazol	CYP2C9, CYP2C19		
Mifepriston	CYP3A4		
Moclobemide	CYP2C19, CYP2D6		
Nelfinavir	CYP3A4		

1. Anforderung: Indikationen für TDM

Inhibition - Desinhibition

Plasmakonzentration Medikament A

Pharmakokinetische Wechselwirkungen

Induktion - Deinduktion

Plasmakonzentration Medikament A

Zeit (Tage)

Polypharmazie: Kombination mit Carbamazepin

	CYP2D6	CYP3A4
Aripip		

- Exter
CYP

- Kombination nützlich?
- Kombination riskant?
- Was passiert?
- Was ist klinisch relevant?
- Was tun?

Hydroxylation
CYP3A4, CYP2D6

Hydroxylation
CYP3A4, CYP2D6

Aripiprazole

Dehydrogenation
CYP2D6, CYP3A4

N-Dealkylation
CYP3A4

10.05.2012 Dehydroaripiprazole

Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Interactions Between Carbamazepine and Aripiprazole in Patients With Schizophrenia

Akifumi Nakamura, MD, PhD, Kazuo Mihara, MD, PhD, Goyo Nagai, MD, Takeshi Suzuki, MS, Pharm, and Tsuyoshi Kondo, MD, PhD

FIGURE 1. Intraindividual changes in plasma concentrations of aripiprazole, dehydroaripiprazole, and the active moiety before and after carbamazepine coadministration. CYP2D6 genotypes are expressed as follows: clear circle wt/wt, solid circle *10/wt, solid triangle *5/*10.

Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Interactions Between Carbamazepine and Aripiprazole in Patients With Schizophrenia

Akifumi Nakamura, MD, PhD, Kazuo Mihara, MD, PhD, Goyo Nagai, MD, Takeshi Suzuki, MS, Pharm, and Tsuyoshi Kondo, MD, PhD

FIGURE 1. Intraindividual changes in plasma concentrations of aripiprazole, dehydroaripiprazole, and the active moiety before and after carbamazepine coadministration. *CYP2D6* genotypes are expressed as follows: clear circle *wt/wt*, solid circle **10/wt*, solid triangle **5/*10*.

Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Interactions Between Carbamazepine and Aripiprazole in Patients With Schizophrenia

Akifumi Nakamura, MD, PhD, Kazuo Mihara, MD, PhD, Goyo Nagai, MD, Takeshi Suzuki, MS, Pharm, and Tsuyoshi Kondo, MD, PhD

FIGURE 1. Intraindividual changes in plasma concentrations of aripiprazole, dehydroaripiprazole, and the active moiety before and after carbamazepine coadministration. *CYP2D6* genotypes are expressed as follows: clear circle *wt/wt*, solid circle **10/wt*, solid triangle **5/*10*.

Polypharmazie: Kombinationen mit Carbamazepin

	Blutspiegel- veränderung	Klinische Relevanz
Aripiprazol	Abfall der Wirkspiegel von Aripiprazol und seinem Metaboliten Dehydroaripiprazol um knapp 70%	Interaktion zu erwarten, jedoch bislang keine evidenzbasierten Daten zur klinischen Relevanz. Im Einzelfall kann eine Dosisanpassung notwendig sein.
Was tun?	Klinisch überwachen mit TDM-Kontrolle	

1. Anforderung: Indikationen für TDM

1. Anforderung: Indikationen für TDM

1. Anforderung: Indikationen für TDM

Genetische Besonderheiten

Fig. 3. Relationship between CYP2D6 genotype and ratios of concentrations *O*-desmethylvenlafaxine (ODV)/venlafaxine (V) under steady-state treatment with venlafaxine. PM, poor metabolizers who had two mutant alleles of CYP2D6; IM, intermediate metabolizers who had one active and one mutant allele (*1/*4); EMs, extensive metabolizers who had two active alleles (*1/*1); UMs, ultra rapid metabolizers who had one active and one duplicated active allele (2x*1)/*1. ** $P < 0.01$, PM vs. EM and UM vs. EM, * $P < 0.05$, IM vs. EM.

Verhältnis von VEN/OD-VEN zur Beurteilung des Metabolisierungsstatus

- $> 1/1$ → Poor metabolizer
- $1/3$ bis $1/6$ → Extensive metabolizer
- $1/9$ bis $1/11$ → Ultrarapid metabolizer

Shams, Hiemke et al.; CYP2D6 polymorphism and clinical effect of the antidepressant venlafaxine, *Journal of clinical pharmacy and therapeutics*, Volume 31, Issue 5, 493-502, 2006

Genetische Besonderheiten

Drug	Metabolite	Ratio: of concentrations metabolite: parent drug (Mean - SD - Mean + SD)	Reference
Sertraline	Norsertaline	1.7-3.4 (n=348)	[546]
Trazodone	m-Chlorophenylpiperazine (mCPP)	0.04-0.22 (total range)	[328]
Trimipramine	Nortrimipramine*	0-12.0 (n=17)	[142]
Venlafaxine	O-Desmethylvenlafaxine*	EM or IM CYP2D6: 0.3-5.2 PM CYP2D6: ≤0.3 UM CYP2D6: >5.2	[592]
	N-Desmethylvenlafaxine	0.46-1.48	

Hiemke et al.; AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry: Update 2011; Pharmacopsychiatry 2011;44: 195-235

1. Anforderung: Indikationen für TDM

Kinder und Jugendliche

- Kinder sind keine kleinen Erwachsenen!!!
- Wassermenge pro kg Körpergewicht ist bei einem Neugeborenen ca. 15 Prozent höher
- Neugeborene und besonders Frühgeborene verfügen noch nicht über alle metabolischen Enzyme
- Im Alter von 1 bis 8 Jahren zeigt sich bei Kindern im Vergleich zu Erwachsenen eine erhöhte Verstoffwechslungsrate
- In den ersten Monaten ist das Magenmilieu neutral; in den ersten drei Jahren ist der Magen-pH höher als bei Erwachsenen
- Passage von Nahrungsmitteln durch den Magen-Darm-Trakt ist bei Neugeborenen und Kleinkindern verlangsamt
- Ausscheidungsmechanismus über die Nieren ist in den ersten Lebensmonaten noch nicht vollständig ausgereift

1. Anforderung: Indikationen für TDM

TDM bei Alterspatienten

International Psychogeriatric Association

Deutsche Akademie für
Gerontopsychiatrie und -psychotherapie e.V.

Deutsche Gesellschaft für Gerontopsychiatrie
und -psychotherapie e.V. (DGGPP)

AGS

THE AMERICAN GERIATRICS SOCIETY

Geriatrics Health Professionals.

Leading change. Improving care for older adults.

Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V.
Selbsthilfe Demenz

EUROPEAN ASSOCIATION OF GERIATRIC PSYCHIATRY EAGP

Demographischer Wandel

Abbildung 1: Altersaufbau der Bevölkerung in Deutschland, 1910, 1950, 2010 und 2060

- Gesellschaftliche Herausforderung Gesundheit, Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der älteren Bevölkerung zu erhalten
- Dazu gehört auch eine optimale Arzneimitteltherapie

Gerontopsychiatrie

- Erschwerende Umstände in der medizinischen Versorgung
 - Verminderte Kompensationsreserve (Homöostase)
 - Chronische, somatische Erkrankungen
 - Mangelnde Compliance →
 - Multimorbidität und Polypharmazie
 - Bewegungs- und Kommunikationseinbußen
 - Hör- und Sehminderung
- Änderung der Pharmakodynamik und Pharmakokinetik aufgrund komplexer, altersspezifischer Veränderungen

Non-Compliance mindert den
therapeutischen Erfolg und verursacht
Kosten

Interaktionen

- Polypharmazie inkl. Selbstmedikation, Komorbiditäten, Alkoholkonsum, Wechselwirkungen, pharmakodynamische, pharmakokinetische Veränderungen, komplexe Pharmakotherapie, Altersspätkomplikationen

	Example	Mechanism of action	Outcome
Drug–drug, PK	Gatifloxacin+calcium and antacid	Decrease in absorption of gatifloxacin	Treatment failure ²⁶ Rigidity, falls
Drug–drug			Profound hypoglycaemia ²⁷ Decreased effect of donepezil
Drug–nutritional status	Low albumin+phenytoin	Increase in free phenytoin concentration	Confusion, somnolence, ataxia ²⁸
Drug–herbal product	Ginkgo+aspirin	Decrease in platelet function and adhesion	Increased risk of bleeding ²⁹
Drug–alcohol	Alcohol+chronic use of bromazepam	Synergy	Increased risk of falls
Drug–disease or drug–patient	Metoclopramide for gastric dysmotility in a patient with Parkinson's disease	Increase in dopamine receptor blockade	Worsening Parkinson's disease ³⁰

Cp=plasma concentration. CYP=cytochrome P450. PD=pharmacodynamic. PK=pharmacokinetic.

Table: Examples of different types of drug interactions in elderly patients

Polypharmazie und daraus resultierende UAW sind eine häufige Ursache für eine stationäre Aufnahme

erhöhen die
Risiko

AM-Interaktion

Table 1 Continued.

Drug (active metabolite)	Enzymes	Reference
Mirtazapine	CYP3A4, CYP1A2, CYP2B6, CYP2D6	[397, 630]
Moclobemide	CYP2C19 , CYP2D6	[255]
Modafinil	Amide hydrolysis, CYP3A4	[561]
Naltrexone	Aldoketoreductase AKR1C4	[92]
Nortriptyline	CYP2D6	[385, 485, 687]
Olanzapine	N-Glucuronosyltransferase, Flavin monooxygenase, CYP1A2, CYP2D6	[107]
Opipramol		
Paliperidone (=9-Hydroxyrisperidone)		[161]
Paroxetine		[209, 349, 691]
Perazine		[629, 725]
Pergolide		[731]
Perphenazine		[12, 77, 168, 486]
Pregabalin		[77]
Piripiedil		[168]
Pimozide		[171]
Pramipexole		[62]
Promazine	CYP1A2, CYP2C19, CYP3A4	[726]
Promethazine	CYP2D6	[465]
Quetiapine	CYP3A4 , CYP2D6	[38]
Rasagiline	CYP1A2	[277]
Reboxetine	CYP3A4	[307, 716]
Risperidone (9-Hydroxyrisperidone)	CYP2D6 , CYP3A4	[732]
Ropinirole	CYP1A2	[357]
Rotigotine	Glucuronosyltransferase, several other unknown pathways	[115]
Selegiline	CYP2B6	[60]
Sertindole	CYP3A4 , CYP2D6	[729]

Wechselwirkungen sind klinisch relevant, wenn die therapeutische Aktivität und/oder Toxizität eines Arzneistoffes in dem Maße verändert wird, dass eine Anpassung der Dosis oder ein medizinisches Einschreiten notwendig wird

Pharmakokinetik

Table 1. Age-related physiological changes and their pharmacokinetic consequences.

Physiological changes in the elderly	Pharmacokinetic consequences
Increased gastric pH	Slightly decreased absorption (freely clinically significant)
Delayed gastric emptying	
Reduced splanchnic blood flow	
Decreased absorption surface	
Decreased gastrointestinal motility	
Increased body fat	Increased V _d and C _{1/2} of lipophilic drugs
Decreased lean body mass	
Decreased total body water	Increased plasma concentration of hydrophilic drugs
Decreased serum albumin	Increased free fraction in plasma of a low highly protein-bound acidic drugs
Increased C _{1/2} of highly protein-bound drugs	Decreased free fraction of basic drugs
Decreased hepatic blood flow	First-pass metabolism can be less effective.
Decreased hepatic mass	Phase I metabolism of some drugs might be slightly impaired.
Decreased renal blood flow and glomerular filtration rate	Renal elimination of drugs can be impaired.

P-gp-Aktivität ↓

→ BHS wird höheren Medikamenten- bzw.

Toxindosen ausgesetzt.

Altersbedingte, pharmakokinetische Veränderungen können einen praxisrelevanten Einfluss auf die Plasmaspiegel haben, das Ausmaß der Veränderungen ist jedoch innerhalb der Patientengruppe sehr verschieden und individuell zu berücksichtigen

→ Mit steigendem Alter zunehmender Einfluss aufgrund fortschreitendem „körperlichen Abbau“

Gesamtkörperclearance (GKC, weiß) und Gesamtkörpervolumen (GKV, schwarz) in unterschiedlichen Lebensstadien (GKC und GKV sind relativ zu denen des Erwachsenen (10-18/20-60 Jahre) dargestellt. Das Verteilungsvolumen übersteigt die GKC im Neugeborenenalter (1-15 Tage, Verteilungsvolumen für die meisten Arzneistoffe groß!) und dann wieder im höheren Alter (70-95 Jahre).

Klotz et al.; Pharmacokinetics and drug metabolism in the elderly; Drug Metabolism Reviews, 2009; 41 (2): 67-76

Betrifft v.a. High-Clearance AS → BV ↑

Pharmakodynamik

Typische UAW von Psychopharmaka, die bei älteren Patienten gehäuft auftreten, sind Verwirrtheit, Delir, Sedierung, gastrointestinale Störungen oder extrapyramidal-motorische Störungen

Pharmakodynamik

Altersbedingte, pharmakodynamische Veränderungen können einen praxisrelevanten Einfluss auf die Wirkung eines Psychopharmakons haben, das Ausmaß der Veränderungen ist jedoch innerhalb der Patientengruppe sehr verschieden und individuell zu berücksichtigen

→ Mit steigendem Alter zunehmender Einfluss aufgrund fortschreitendem „körperlichen Abbau“

Richtlinien für die Psychopharmakotherapie

- Beginn der Medikation mit etwa 50% der Dosis („start low – go slow“) → Pauschalisierung: Risiko einer Unterdosierung und der Non-Response, bzw. langsamerer Therapieeffekt
- Dosis kurzfristig und regelmäßig überprüfen, Weiterbehandlung mit der niedrigst möglichen Dosis („minimale effektive Dosis“)
- Engmaschige Kontrollen der Serumspiegel („Drug Monitoring“)
- Vor jeder Therapie: Bestimmung der Nierenfunktion (GFR)
- Pharmakogen bedingte Symptombilder beachten, z.B. Exsikkose, Synkopen, Stürze, EPS
- Kritische Therapiekontrolle - insofern möglich Auslass- und Reduktionsversuche
- Möglichst nebenwirkungsarme Medikamente wählen
- Tabletten, Tropfen oder Saft bevorzugen → werden von Älteren besser geschluckt und im Verdauungstrakt besser transportiert als Kapseln

TDM in der Gerontopsychiatrie

- Therapeutisches Drug Monitoring (TDM) erlaubt eine optimale Doseinstellung gemäß der Bedürfnisse der Gerontopatienten
- Optimale Dosis
- Risikoreduktion
Überdosierung
- Compliancekontrolle
- Senkung der Behandlungs- und Medikamentenkosten

- Optimierung der Psychopharmakotherapie

Aufgrund zunehmender Heterogenität des Patientenkollektivs ist eine zunehmend individualisierte Therapie vonnöten

In elderly patients, who frequently are hypersensitive to medication, TDM is helpful to distinguish between pharmacokinetic and pharmacodynamic factors when adverse effects occur [666]. Progressive impairments of the functional organs [407], especially renal excretion, and changes significantly [361,374]. Hepatic clearance is reduced by up to 30%. Phase I reactions are favored than phase II reactions. On the other hand, age-dependent changes in CYP isoenzymes and related changes in physiologic and pharmacokinetic parameters as well as the comorbidity and polypharmacy complicate pharmacotherapy in the elderly [125]. Therefore, TDM should be used for these patients to improve safety and tolerability of psychopharmacotherapy.

Hiemke et al.; AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry: Update 2011; Pharmacopsychiatry 2011; 44: 195–235

Klassifizierung der anticholinergen Aktivität von Psychopharmaka

Tabelle 2 Wirkstoffe mit Risiko für die Entwicklung eines Delirs (AGATE-Liste).

Basis der Tabelle ist die Klassifikation von Chew et al. nach der anticholinergen Aktivität der Wirkstoffe [11] und die Identifizierung eines hohen delirigen Potentials nach Ancelin et al. [12].
Ferner wurden die Wirkstoffe der PRISCUS-Liste in die Tabelle aufgenommen, die dort mit einem Risiko für die Entwicklung eines Delirs bei älteren Patienten genannt werden [16].

Spalte (1) keine anticholinerge Aktivität in therapeutischen Dosen; in höheren Dosen tritt jedoch eine geringe anticholinerge Aktivität auf.

Spalte (2) geringe anticholinerge Aktivität in therapeutischen Dosen vergleichbar einer Atropinkonzentration von 0,5 – 5 pmol/mL

Spalte (3) mittelmäßige anticholinerge Aktivität in therapeutischen Dosen vergleichbar einer Atropinkonzentration von 5 – 15 pmol/mL

Spalte (4) hohe anticholinerge Aktivität in therapeutischen Dosen vergleichbar einer Atropinkonzentration von über 15 pmol/mL

Die normal geschriebenen Wirkstoffe der Spalten (1) – (4) wurden von Chew et al., die unterstrichenen Wirkstoffe wurden von Ancelin et al. klassifiziert. Amitriptylin weist in beiden Zusammenstellungen eine hohe anticholinerge Aktivität auf.

Substanzklasse	(1) keine oder minimale anticholinerge Aktivität	(2) geringe anticholinerge Aktivität	(3) mittelmäßige anti- cholinerge Aktivität	(4) hohe anticholinerge Aktivität	delirigenes Potential laut PRISCUS-Liste [16]	nicht in diesen Listen enthalten
Analgetika und antiinflammatorisch wirkende Mittel	Celecoxib Fentanyl Hydrocodon Propoxyphen			<u>Colchicin</u>	Pethidin	Oxycodon [10]
Antidepressiva	Duloxetin	<u>Escitalopram</u> Fluoxetin Mirtazapin	<u>Paroxetin</u>	<u>Amitriptylin</u> Doxepin <u>Trimipramin</u> <u>Opipramol</u> <u>Maprotilin</u> <u>Imipramin</u> <u>Clomipramin</u> <u>Amoxapin</u>		
Antidiabetika	Metformin					
Antihistaminika (H₁)			Diphenhydramin	<u>Alimenazin</u> <u>Chlorphenamin</u> <u>Dexchlorpheniramin</u>	Clemastin Dimetinden Hydroxyzin Triprolidin	
Antinfektiva	Amoxicillin Cephalexin Levofloxacin					
Antipsychotika		Quetiapin	Chlorpromazin Olanzapin	<u>Clozapin</u> <u>Thioridazin</u> <u>Levomepromazin</u>		

**CAVE: anticholinerges
Syndrom**

Klassifizierung der Wahrscheinlichkeit einer QTc-Zeit-Verlängerung/TdP von Psychopharmaka

TABLE

Effects of psychotropic drugs on QTc and the occurrence of torsade de pointes (TdP)

Drug	QTc prolongation	QTc (Bazett) prolongation compared to baseline in ms (n); reference no.	Reported cases of TdP	TdP risk (Arizona CERT)	DDD in Germany, 2009 (millions)	References
Typical high-potency antipsychotic drugs						
Thioridazine ¹	+++	+28 to 36.6 (n = 60); 10	+++	1	1.3	2, 4–6, 10, 12–14, 23, 24, e6
Haloperidol ¹	+	+3.8 to 8.9 (n = 147; 4–15 mg); 4	+++	1	18.4	2, 4–6, 8, 10, 12–15, 19, 23, 24, e1, e6
Pimozide ¹	+++	+19 to 24 (n = 97); 10	+	1	1.0	2, 5, 6, 10, 19, 23, 24, e29
Perphenazine ¹	+	-55 to -16.6 (-35.7; n = 4); 7	+		0.5	5, 7
Fluphenazine ¹	+		+		8.2	5–7, 24, 25
Flupentixole ¹	+		N.R.		9.6	5, 6, 25
Tri- and tetracyclic antidepressants						
Amitriptyline ¹	+++	+1 to 21 (n = 117); 10	++	3	94.5	7, 10, 18, 23, 24, e21, e23
Doxepine	+++	+8 to 22 (n = 20); 10	++	3	54.2	7, 10, 18, 23, 24, e24
Imipramine ¹	+++	+4 to 20 (n = 76); 10	+	3	2.6	7, 10, 23, 24, e25
Clomipramine ¹	++	-1.6 to 14.7 (+6.6; n = 19); 7	++	3	8.1	7, 10, 18, 23, 24
Desipramine ¹	+++	+11 to 24 (n = 74); 10	+	3	N.R.	10, 18, 23, 24

Potenziell inadäquate Medikation (PIM)

Potenziell inadäquate Medikation für ältere Patienten					
	Ergebnis der Delphi-Befragung (LJkert-Skala, MW [95% KI], Median)	Begründung	Therapie-Alternativen	Maßnahmen, falls das Arzneimittel trotzdem verwendet werden soll:	Das Arzneimittel sollte, wenn möglich, nicht bei den genannten Begleiterkrankungen verwendet werden (zu vermeidende Komorbiditäten)
		Originalzitate Liste 1 - Beers MH 1997 Liste 2 - Fick DM et al. 2003 Liste 3 - McLeod et al. 1997 Liste 4 - Laroche JL et al. 2007			
Antidepressiva (n = Anzahl der Antworten)					
Klassische Antidepressiva		Auf der Liste 3 als Gruppe aufgeführt. <i>May aggravate glaucoma, cause urinary retention in patients with BPH or worsen heart block, may cause anticholinergic side effects. May worsen postural hypotension and cause falls¹. Muscarinic-blocking agents with cardiotoxicity when overdosed. Tricyclics at times more active than SSRIs, but their benefit/risk ratio is less favourable in the elderly. Second choice drugs¹.</i>			
Amitriptylin (n = 17)	2,12 [1,49 - 2,74] 2,00	Es besteht für ältere Patienten ein erhöhtes Risiko für das Auftreten von deliranten Syndromen (Fachinformation). Amitriptylin steht bei älteren Patienten im Zusammenhang mit einem erhöhten Risiko für Hüftfrakturen (Ray et al. 1987). Es führt häufiger zu Nebenwirkungen, insbesondere anticholinerge Nebenwirkungen, auch im Vergleich zu SSRI (Hutchinson et al. 1990, Kyle et al. 1998). Aktueller Amitriptylin-Gebrauch steht bei Patienten > 70 Jahre mit einem erhöhten Risiko für venöse Thromboembolien im Zusammenhang, wobei das Risiko mit mit zunehmender Dosis ansteigt (Jick et al 2008). Auf den Listen 1, 2 und 4. <i>Because of its strong anticholinergic and sedation properties, Amitriptyline is rarely the antidepressant of choice for elderly patients^{1,2}.</i>	SSRI (z.B. Cit Mirtazap		EKG Risikoerkrankungen in Bezug auf periphere anticholinerge Effekte (Glaukom, Miktionstörungen, Obstipation usw.) Kardiale Erkrankungen: Schenkelblockbilder im EKG, schwere Herzerkrankungen, insbesondere mit Vorliegen von Erregungsleitungsstörungen, höhergradiger AV-Block, KHK, Herzinsuffizienz ZNS-Funktionsstörungen (Demenz, Delir, Hirnorganische Störungen) Niereninsuffizienz Leberfunktionschäden Urologische Störungen/ Probleme (Benigne Prostatatypertrophie mit Restriktbildung, Hamverhalt) Hypotonie, Kollaps, Schock Exzitation Intoxikationen Blutzyktrien (Vorsicht bei) Epilepsie (Vorsicht bei) Leukopenie (Vorsicht bei) Phäochromozytom
				Dosisanpassung/ Dosisreduktion (1/2-Hälfte der üblichen Tagesdosis, einschleichend dosieren)	

Die Wahl des für den individuellen Alterspatienten am besten geeigneten Psychopharmakons steigert zusätzlich die Arzneimitteltherapiesicherheit

1. Anforderung: Indikationen für TDM

Pharmakokinetisch relevante Komorbiditäten

Nierenfunktion

Table 1. Typical classification of renal function. Groups 1-5 defined according to the creatinine clearance value.

Group	Description	Creatinine clearance (mL/min)
1	Normal renal function	> 80 mL/min
2	Mild renal impairment	50-80 mL/min
3	Moderate renal impairment	30-50 mL/min
4	Severe renal impairment	< 30 mL/min
5	ESRD	Requiring dialysis

The renal function groups 1-5 should be comparable to each other with respect to age, gender, and weight. The Cockcroft-Gault formula is one way of estimating creatinine clearance based on serum creatinine levels (Kasper et al., 2005), See also Table 11.

ESRD, end-stage renal disease.

Besonders wichtig ist eine Dosisanpassung, insofern

- die Kreatinin-Clearance des Patienten < 50 ml/min
- der Q₀-Wert (extrarenaler Ausscheidungsbruchteil bei normaler Nierenfunktion) des Arzneimittels < 0,5 ist

Table 11. Cockcroft-Gault equation for creatinine clearance (Cockcroft and Gault, 1976).

Males

$$CL_{CR} = \frac{(140 - \text{age}) \cdot \text{TBW}}{72 \cdot \text{CR}}$$

Females

$$CL_{CR} = \frac{(140 - \text{age}) \cdot 0.85 \cdot \text{TBW}}{72 \cdot \text{CR}}$$

Age is expressed in years.

TBW, total body weight in kg; Ht, height in m; CR, serum creatinine in mg/dL. CL_{CR} , creatinine clearance in mL/min.

Aymanns et al.: Review on Pharmacokinetics and Pharmacodynamics and the aging kidney; *Clin J Am Soc Nephrol* 5: 314-327, 2010

Pharmakokinetisch relevante Komorbiditäten

Leberfunktion

CHILD-PUGH CLASSIFICATION OF SEVERITY OF LIVER DISEASE

Parameter	Points Assigned		
	1	2	3
Ascites	Absent	Slight	Moderate
Bilirubin (mg/dL)	≤ 2	2 to 3	> 3
Albumin (g/dL)	> 3.5	2.8 to 3.5	< 2.8
Prothrombin Time			
Seconds over control	1 to 3	4 to 6	>6
INR	< 1.7	1.8 to 2.3	> 2.3
Encephalopathy	None	Grade 1 to 2	Grade 3 to 4

Modified Child-Pugh Classification of the severity of liver disease according to the degree of ascites, the plasma concentrations of bilirubin and albumin, the Prothrombin time, and the degree of encephalopathy. A total score of 5 to 6 is considered Grade A (well-compensated disease); 7-9 is Grade B (significant functional compromise); and 10 to 15 is Grade C (decompensated disease). These grades correlate with one and two year survival; Grade A – 100% and 65%; Grade B: 80% and 60%; and Grade C – 45% and 35%.

Blutentnahme: Talspiegel & Steady State

10.05.2012

Blutentnahme → Probenversand

- Serum o. Plasma
- Lagerung bis Versand
 - bei 4°C ≤ 24h
 - bei -20°C > 24h

Ausnahme: [Olanzapin](#)

- begleitend dazu:

[Anforderungsschein](#)

RILIBÄK 2008

- Ein Labor muss die RiliBäk (Richtlinien der Bundesärztekammer) Anforderungen erfüllen
- Die eingesetzten Methoden müssen validiert sein und die Kontrollproben innerhalb vorgeschriebener Fehlergrenzen liegen
- Wichtig für eine Empfehlung ist das Wissen über den therapeutischen Bereich sowie über pharmakokinetische und pharmakodynamische Daten

Befundung

PsiaOnline

Startseite Die Autoren

Interaktionsuche Wirkstoffliste Handlumenliste

Benutzername:
Neubnutzen

Passwort:

Anmelden

Jetzt registrieren!
Passwort vergessen?

Willkommen beim neuen PsiaOnline!

PsiaOnline umfasst
7309 Interaktionen
zwischen
968 Wirkstoffen

Davon wurden 13 Interaktionen
in den vergangenen 14 Tagen
angelegt oder aktualisiert.

Arzneimittelinteraktion

Interaktionspharmakologie ist äußerst komplex, sehr detailliert
allein der pharmakokinetischen Interaktionseffekte ist meist
Deshalb ist es in der alltäglichen Situation oft sehr schwierig,
Kombinieren von Medikamenten zu treffen.

Hier hilft PsiaOnline! Geben Sie einfach die verordneten
Interaktionen.

Benkert
Hippus

**Kompendium
der Psychiatrischen
Pharmakotherapie**

8. Auflage

Ulrich Benkert von
2. Aufl. (1994) und
Hippus (1. Aufl.)
H. Hippus

Befundung
Qualifikation: Ärzte und Apotheker
Schulung/Einweisung
Tägliche Befundung der Laborergebnisse

- P. Baumann¹
- C. Hienke²
- S. Ulrich³
- G. Eckermann⁴
- I. Gaertner⁵
- M. Gerlach⁶
- H.-J. Kuss⁷
- G. Lause⁸
- B. Müller-Oerlinghausen⁹
- M. L. Rao¹⁰
- P. Riederer¹¹
- G. Zernig¹²

The AGNP-TDM Expert Group Consensus Guidelines:
Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry

Arzneistoff-Infoblätter

Arzneimittel-Informationen
für Ärzte und Apotheker

tagesaktuell

FachInfo
Service

Login

Stand: 12.12.2009

AutoKinetic

Wirkstoffliste
dosisbezogener
Bereich

Neurochemisches Labor
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Universitätsmedizin Mainz
Untere Zahlbacher Str. 8
D-55131 MAINZ

EINSENDER
 (Stempel mit Fax-Nr. für die Befundmitteilung):

Pat.-Name _____ Vorname _____ Geb. _____
 stationär privat stationär ambulant privat ambulant

Medikament(e) _____

Dosis _____

Seit wann: _____

Letzte Einnahme: _____

BLUTENTNAHME (in der Regel nüchtern im Steady state, mind. 12 Stunden nach der letzten Medikamenteneinnahme, 5 bis 10 ml Vollblut in Serum-Monovette, weiß)

Begleitmedikamente (bitte alle angeben)

Nichtraucher Raucher (mäßig, < 10 Zig/Tag) Raucher (stark, > 10 Zig/Tag)

Anforderung (bitte vollständig ausfüllen und Hinweise auf Seite 2 beachten)

BLUTENTNAHME nüchtern, mind. 12 Stunden nach der letzten Medikamenteneinnahme, 5 bis 10 ml Vollblut in Serum-Monovette, weiß (gewünschte Bestimmung ankreuzen)

Phasenprophylaktika

Lithium (Li 0,5-0,8 mmol/l)

Antidepressiva

Amitriptylin (AMI, 80-200 ng/ml)*

Bupropion (BUP, 300-800 ng/ml)*

Citalopram (CIT, 50-130 ng/ml)

Clomipramin (CL, 175-450 ng/ml)*

Doxepin (DOX, 50-150 ng/ml)*

Duloxetine (DLX, 60-120 ng/ml)

Escitalopram (ESC, 25-80 ng/ml)

Fluvoxamin (FLV, 60-230 ng/ml)

Fluoxetin (FLUOX, 120-300 ng/ml)*

Imipramin (IMI, 175-300 ng/ml)*

Maprotilin (MAP, 75-130 ng/ml)*

Mirtazapin (MIR, 40-80 ng/ml)

Nortriptylin (NOR, 70-170 ng/ml)

Paroxetin (PAROX, 40-120 ng/ml)

Reboxetin (REB, 10-100 ng/ml)

Sertralin (SER, 20-50 ng/ml)

Venlafaxin (VEN, 200-400 ng/ml)*

Antipsychotika

Amisulprid (AMS, 100-320 ng/ml)

Aripiprazol (ARI, 150-250 ng/ml)

Clozapin (CLZ, 350-600 ng/ml)

Flupentixol (FPX, 2-15 ng/ml)

Haloperidol (HAL, 5-17 ng/ml)

Olanzapin (OLZ, 20-80 ng/ml)

Paliperidon (Pali, 20-60 ng/ml)

Perazin (PER, 100-230 ng/ml)

Quetiapin (QUE, 70-300 ng/ml)

Risperidon (RIS, 20-60 ng/ml)*

Sertindol (SERT, 50-250 ng/ml)

Ziprasidon (ZIP, 50-120 ng/ml)

Zuclopenthixol (ZPX, 4-50 ng/ml)

Andere

Donepezil (DON, 30-75 ng/ml)

Naltrexon (NAL, 20-100 ng/ml)*

* Summe Muttersubstanz plus pharmakologisch aktiver Metabolit

GRUND DER ANFORDERUNG (Zutreffendes bitte ankreuzen, siehe auch Hinweise für Einsender)

- Ersteinstellung Dosisänderung Umstellung der Medikation
 Nichtansprechen Compliance-Kontrolle Nebenwirkung (bitte unten spezifizieren)
 Verlaufskontrolle anderer Grund (bitte spezifizieren)
 Sonderuntersuchung (bitte spezifizieren)

SCHWEREGRAD DER ERKRANKUNG (nach CGI, siehe Hinweise für Einsender)

- nicht beurteilbar nicht krank Grenzfall leicht krank mäßig krank
 deutlich krank schwer krank extrem schwer krank

THERAPIE-EFFEKT (nach CGI, siehe Hinweise für Einsender)

- sehr gut mäßig gering unverändert oder verschlechtert nicht beurteilbar

NEBENWIRKUNGEN (nach UKU): keine leicht mittel schwer

- Schläfrigkeit/Sedierung Spannung/innere Unruhe Akkomodationsstörungen
 Hauterscheinungen Speichelfluss (erhöht/verringert) Polydipsie
 EPS-Nebenwirkungen (Dystonie/Rigidität/Hypokinese/Akinese) Tremor Akathisie
 kardiovaskuläre Störung (orthostatische Dysregulation/Tachykardie)
 gastrointestinale Störungen (Übelkeit/Erbrechen/Nausea/Diarrhoe/Obstipation) Gewichtszunahme
 urogenitale Störungen (Miktionsstörung/sexuelle Dysfunktion/Polyurie)
 andere Nebenwirkung (bitte spez.)

Zusammenhang mit dem zu analysierenden Medikament: wahrscheinlich möglich unwahrscheinlich

Datum _____ Behandelnde/r Arzt/ Ärztin _____

ERGEBNISSE (ng/ ml) und BEURTEILUNG

Blutspiegel: im therapeutisch üblichen Bereich zu niedrig zu hoch
 Empfehlung: Dosis beibehalten erhöhen reduzieren auf _____ mg/Tag

Datum _____ Unterschrift (Labor) _____

10.05.2012

Befundung: Anforderungsschein - Patientendaten

Therapeutisches Drug Monitoring von Psychopharmaka

Neurochemisches Labor
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Untere Zahlbacher Str. 8
D-55131 MAINZ

Geschlecht

Alter

- Möglichkeit der klinischen Überwachung für die Befundmitteilung):
- Ambulante Patienten häufiger non-compliant

NAME: VORNAME: Geb: Diagnose:	<ul style="list-style-type: none"> • stationär • ambulant • privat 	<ul style="list-style-type: none"> • Nichtraucher • Raucher (mäßig, < 10 Zig/Tag) • Raucher (stark, > 10 Zig/Tag) 	
Medikament(e):	Dosis:	Seit wann:	Letzte Einnahme:

ICD-10

CYP 1A2-Induktion

Begleitmedikamente (bitte alle angeben, psychiatrische und nicht psychiatrische Medikation)
.....
.....

ICD Code – International Classification of Diseases

- ICD-10-GM (Version 2009)
→ Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten

www.icd-code.de

Herausgeber: Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information, (DIMDI)

Kapitel I	A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten_	Kapitel XII	L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut_
Kapitel II	C00-D48	Neubildungen_	Kapitel XIII	M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes_
Kapitel III	D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems_	Kapitel XIV	N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems_
Kapitel IV	E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten_	Kapitel XV	O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett_
Kapitel V	F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen_	Kapitel XVI	P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben_
Kapitel VI	G00-G99	Krankheiten des Nervensystems_	Kapitel XVII	Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien_
Kapitel VII	H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde_	Kapitel XVIII	R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind_
Kapitel VIII	H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes_	Kapitel XIX	S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen_
Kapitel IX	I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems_	Kapitel XX	V01-Y84	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität_
Kapitel X	J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems_	Kapitel XXI	Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen_
Kapitel XI	K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems_	Kapitel XXII	U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke_

Befundung: Anforderungsschein - Diagnose

F00-F99 Kapitel V Psychische und Verhaltensstörungen

Inkl.: Störungen der psychischen Entwicklung.

Exkl.: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind ([R00-R99](#))

Info.: Dieses Kapitel gliedert sich in folgende Gruppen:

[F00-F09](#) Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen

[F10-F19](#) Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen

[F20-F29](#) Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen

[F30-F39](#) Affektive Störungen

[F40-F48](#) Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen

[F50-F59](#) Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren

[F60-F69](#) Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen

[F70-F79](#) Intelligenzstörung

[F80-F89](#) Entwicklungsstörungen

[F90-F98](#) Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend

[F99-F99](#) Nicht näher bezeichnete psychische Störungen

Dieses Kapitel enthält die folgenden Sternschlüsselnummern:

[F00*](#) Demenz bei Alzheimer-Krankheit

[F02*](#) Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheiten

Befundung: Anforderungsschein – Klinische Angaben

Diagnose:			
Medikament(e):	Dosis:	Seit wann:	Letzte Einnahme:

Begleitmedikamente (bitte alle angeben, psy

Interaktionen

Anforderung (bitte vollständig ausfüllen t

BLUTENTNAHME nüchtern, mind. 12 Stunden nach de
Monovette, weiß (gewünschte Bestimmung ankreuzen)

Antidepressiva

- Amitriptylin (AMI, 80-200 ng/ml)*
- Citalopram (CIT, 50-130 ng/ml)
- Clomipramin (CI, 175-450 ng/ml)*
- Doxepin (DOX, 50-150 ng/ml)*
- Duloxetin (DLX, 60-120 ng/ml)
- Escitalopram (ESC, 25-80 ng/ml)
- Fluvoxamin (FLV, 60-230 ng/ml)

- Fluoxetin (F)
- Paroxetin (P)
- Sertralin (S)
- Venlafaxin

Antipsychoti

- Amisulprid
- Aripiprazol (ARI 150-250 ng/ml)

* Summe Muttersubstanz plus pharmakologisch aktiver Metabolit

(Zusatzfächer bitte ankreuzen, siehe auch Hinweis für Einzeldat)

Befundung: Anforderungsschein

Routine

(Zutreffendes bitte ankreuzen, siehe auch |

GRUND DER ANFORDERUNG

- Ersteinstellung
- Dosisänderung
- Umstellung der Medikation
- Nichtansprechen
- Compliance-Kontrolle
- Verlaufskontrolle
- Nebenwirkung (bitte unten spezifizieren)
- Sonderuntersuchung (bitte spezifizieren)
- anderer Grund (bitte spezifizieren)

Befundung: Anforderungsschein – Klinische Angaben

Hinweise für Einsender)

SCHWEREGRAD DER ERKRANKUNG <i>(nach CGI)</i>	THERAPIE-EFFEKT <i>(nach CGI)</i>
<ul style="list-style-type: none">• nicht beurteilbar• nicht krank• Grenzfall• leicht krank• mäßig krank• deutlich krank• schwer krank• extrem schwer krank	<ul style="list-style-type: none">• sehr gut• mäßig• gering• unverändert oder verschlechtert• nicht beurteilbar

abhängig von der

Bezieht sich auf Beginn
der medikamentösen
Behandlung

sollte möglichst für die
vorausgehende Behandlungswoche
angegeben werden - wenn dies nicht
möglich ist, sollte der Tag der
Blutentnahme erfasst werden

→ Der CGI (Clinical Global Impression Index) ist unabhängig von der Erkrankung einsetzbar und schnell im Routinealltag umsetzbar

Befundung: Anforderungsschein – Ergebnis & Beurteilung

NEBENWIRKUNGEN (nach UKU):	• keine	• leicht	• mittel	• schwer
• Schläfrigkeit/Sedierung	• Spannung/innere Unruhe	• Akkomodationsstörungen		
• Hauterscheinungen	• Speichelfluss (erhöht/verringert)	• Polydipsie		
• EPS-Nebenwirkungen (Dystonie/Rigidität/Hypokinese/Akinese)	• Tremor	• Akathisie		
• kardiovaskuläre Störung (orthostatische Dysregulation/Tachykardie)				
• gastrointestinale Störungen (Übelkeit/Erbrechen/Nausea/Diarrhoe/Obstipation)	• Gewichtszunahme			
• urogenitale Störungen (Miktionsstörung/sexuelle Dysfunktion/Polyurie)-				
• andere Nebenwirkung (bitte spez.)				
Zusammenhang mit dem zu analysierenden Medikament: • wahrscheinlich • möglich • unwahrscheinlich				

Datum	Behandelnde/r Arzt/ Ärztin		
ERGEBNISSE (ng/ ml) und BEURTEILUNG			
..... ng/ml	 ng/ml	Summe: ng/ml	
Blutspiegel:	• im therapeutisch üblichen Bereich	• zu niedrig	• zu hoch
Empfehlung:	Dosis • beibehalten • erhöhen	• reduzieren	

Datum Unterschrift (Labor)

Konsensusleitlinien

- Definition von Indikationen für TDM
- Mitteilung von Steady-State Plasmakonzentrationen (bei klinisch wirksamen Dosen), bei denen mit höchster Wahrscheinlichkeit mit Therapieansprechen gerechnet werden kann
- Definition einer literaturbasierten Graduierung des Einsatzes von TDM für einzelne Psychopharmaka
- Darstellung pharmakokinetischer, pharmakogenetischer und analytischer Grundlagen
- Darstellung der Beziehung von Plasmakonzentrationen und klinischer Wirkung
- Empfehlungen zur praktischen Durchführung von TDM in der Psychiatrie

- interdisziplinäre TDM-Arbeitsgruppe der AGNP (www.agnp.de)

Kompendium der Psychiatrischen Pharmakotherapie

- Kenntnisse der klinischen Praxis und psychopharmakologischen Wissenschaft
- Neue Ergebnisse der Wissenschaft werden gesichtet und kritisch hinterfragt
- Wertung von Therapiestrategien

PsiacOnline

- Interaktionscomputer der Psychiatrie
- Interaktionen von Psychopharmaka untereinander und mit nicht-psychiatrischer Medikation
- Online verfügbar
- 7356 Interaktionen zwischen 971 Wirkstoffen
 - Davon wurden 8 Interaktionen in den vergangenen 14 Tagen angelegt oder aktualisiert (Stand: 01.05.2012)
- www.psiac.de

The screenshot shows the PsiacOnline website interface. At the top, there is a navigation bar with 'Startseite' and 'Die Autoren' buttons. Below this is a search bar with 'Interaktionssuche', 'Wirkstoffliste', and 'Handelsnamenliste' tabs. The main content area features a login form with fields for 'Benutzername:' (containing 'testbenutzer') and 'Passwort:' (with masked characters), and an 'Anmelden' button. To the right of the login form is a welcome message: 'Willkommen beim neuen PsiacOnline!' followed by a paragraph of text. Further right is a statistics box stating 'PsiacOnline umfasst 7309 Interaktionen zwischen 968 Wirkstoffen' and 'Davon wurden 13 Interaktionen in den vergangenen 14 Tagen angelegt oder aktualisiert.' Below the login form are links for 'Jetzt registrieren!' and 'Passwort vergessen?'. At the bottom, there is a section titled 'Arzneimittelinteraktionen in der Praxis' with a paragraph of text and a final note: 'Hier hilft PsiacOnline! Geben Sie einfach die verordneten Medikamente ein und erhalten Sie eine detaillierte Beschreibung der möglichen Interaktionen.'

10.05.2012

Rote Liste / Fachinformation

- Online Service
- Arzneimittelinformationen des Herstellers

The screenshot shows the 'ROTE LISTE® Online' search interface. At the top, there is a navigation bar with links: Impressum, Inhalt, Suche, Service, Links, and FachInfo-Service. Below this, a search bar contains the text 'Suche:' followed by a search button 'Start' and a 'Präparate' filter. A search result count shows 'Präparate: 8342'. On the right side, there are instructions for searching: 'Bitte geben Sie Ihren Suchbegriff ein (mindestens zwei Buchstaben) und...', 'Für Präparate mit vorangestelltem [P] sind Fachinformationen über den...', 'Für Präparate mit vorangestelltem [P]: Keine 'Verlinkung' mit dem Fach...', and 'Grau markierte Präparate [P] sind Kombi-Präparate'.

The advertisement for 'FachInfo Service' features a blue header with navigation links: Impressum, Suche, Merkzettel, Service, Links, and ROTE LISTE® Online. The main text reads 'Arzneimittel-Informationen für Ärzte und Apotheker' and 'tagesaktuell'. The central graphic includes a female doctor, a human torso diagram, a collection of colorful pills, and a male doctor. The 'FachInfo Service' logo is prominently displayed at the bottom, along with a 'Login' button. The date 'Stand: 16.11.2010' is noted in the bottom right corner.

Arzneistoff-Infoblätter

Fluoxetin		(R,S)
Arzneistoffgruppe	selektiver <u>Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer</u>	
Indikation	Major Depression, Zwangsstörung, Bulimie	FI2009-02
Fertigarzneimittel	Fluoxin 20 mg, einige Generika 10-40 mg	FI2009-02
Dosierung	Kaps., Tabl., Lsg.; mit oder unabhängig von Mahlzeiten Einzel dosis oder geteilt; max. Dosis: 60 mg	FI2009-02
Pharmakodynamik	selektiver <u>Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer</u> praktisch keine Affinität zu α_1 , α_2 , β_1 , β_2 , 5HT, D, H, M, GABA Rezeptoren	FI2009-02
Pharmakokinetik		
t_{max}	6-8 h	
BV	85%	FI2009-02
Pb	95%	
$t_{1/2}$	FLUOX: 4-6Tage, Nor-FLUOX: 4-16 Tage (Steady State: 4-6 Wochen)	Altamura et al. 1994 Clin Pharmacokinet. 26(3):201
CI	6-42 l/h kg	
V	20-40 l/kg	
Metabolisierung	CYP2D6, 2C19 und 2C9	FI2009-02
Polymorphismus	CYP2D6, 2C19	Wang et al: 2001 Clin Pharmacol Ther. 70(1):42
Metabolite	Norfluoxetin (aktiv)	FI2009-02
Ratio	FLUOX: NFLUOX = 1:1 (Ältere); 1:2 (<65 J)	Res et al: 2008 Ther Drug Monit. 31(1):42
Therap. Bereich	120-300 ng/ml	
Dosisbezogener Bereich	Faktor untere Grenze: 0,84 Faktor obere Grenze: 5,90	Berechnung aus kinet. Daten
Interaktionen (pharmakodyn.)	- KI: serotonerge Substanzen zB MAO-Hemmer, Lithium - NSAID, Thrombozytenaggregationshemmer, orale Antikoagulantien: veränderte Gerinnung - mögliche EPS-Verstärkung in Kombi mit AP	FI2009-02
Interaktion (pharmakokinet.)	- FLUOX hemmt CYP2D6 und 3A4 - Benzodiazepin Plasmaspiegelerhöhung durch verzögerte Elimination	FI2009-02
Nebenwirkungen	Alpträume, Schlaflosigkeit, Krampfanfälle, GI-Blutung Halluzinationen, Angst, Suizidgedanken, 0,01-0,1% Hyponatriämie, Pharyngitis, 0,1-1% Leberenzym-Erhöhung, 1- 10% Leukozytose, 0,1-1% Leukopenie, Spontanberichte über erniedrigte Thrombozytenaggregation, anapl. Anämie und Pancytopenie	FI2009-02
Schwangerschaft	keine teratogene Wirkung, geht in die Muttermilch über; keine Hinweise auf Entwicklungsstörungen im 1. Trimester, danach kann das Geburtsgewicht sinken	Comite on Drugs 2000; Pediatrics. 105:880
Gerontopatient	im Mittel um 61% erhöhte Spiegel	Res et al: 2008 Ther Drug Monit. 31(1):42
Kinder/Jugend	wenn die Depression nach 4-6 Sitzungen nicht auf psychologische Behandlung anspricht; der Spiegel ist bei Kindern etwa doppelt so hoch wie bei Adoleszenten	FI2009-02 Pisenti et al: 2009, Ther Drug Monit 31(3):283
Besondere TDM Hinweise	- nicht-lineare Kinetik (Autoinhibition) - Diabetiker: häufiger Hypoglycämie - Kontrolle	Altamura et al. 1994 Clin Pharmacokinet. 26(3):201

Arzneistoff-Infoblätter

PubMed - Primärliteratur

- Wissenschaftsdatenbank
- mehr als 5.200 biomedizinische Zeitschriften
- Artikel online bereits vor dem Erscheinen erhältlich
- Neue und ältere Veröffentlichungen
- Abstract, Volltexte (teilw. Lizenz)

The screenshot shows the PubMed website interface. At the top, there is a search bar with the text 'Brain dopamine response in human opioid addiction'. Below the search bar, there are navigation options like 'Limits', 'History', 'Clipboard', and 'Details'. The search results are displayed in a list format, with the first result highlighted. The title of the first result is 'Brain dopamine response in human opioid addiction'. The authors listed are 'Dinglich MR, Williams TH, Wilson SJ, Taylor LG, Cox CB, Anagnostou M, Giraud C, Brooks DJ, Miles JS, Grasby P, Lindford-Smith AB, Nairi EJ'. The journal information is 'Br J Psychiatry, 2008 Jul;193(1):65-72'. The abstract text is partially visible, starting with 'BACKGROUND: Drugs of dependence cause dopamine release in the rat striatum. Human neuroimaging studies have shown an increase in dopamine in the equivalent region in response to stimulants and other drugs. AIM: We tested whether opioids provoke dopamine release and its relationship to the subjective experience. METHOD: In two combined studies 14 heroin addicts on methadone maintenance treatment underwent two positron emission tomography brain scans of the dopamine system using [11C]raclopride following an injection of placebo and either 50 mg intravenous diamorphine or 10 mg subcutaneous hydromorphone in a double-blind, random order design. RESULTS: Both opioids produced marked subjective and physiological effects, but no measurable change in [11C]raclopride binding. CONCLUSIONS: The absence of a dopamine response to opioid agonists contrasts with that found with stimulant drugs and suggests dopamine may not play the same role in addition to opioids. This questions the role of dopamine in the subjective experience of heroin in opioid addicts.' There are also links for 'Full Text' and 'Links'.

www.pubmed.gov

EZB - Primärliteratur

Elektronische Zeitschriftenbibliothek

Bibliothekssystem der Universität Mainz

Universitätsbibliothek

Mainz

Unser Angebot | Einstellungen

Zeitschriften

- nach Fächern
- alphabetisch
- suchen

- schnelle Suche

Kontakt

Ansprechpartner
 Titelvorschlag

Volltextzeitschriften alphabetisch geordnet

Der Volltext der Zeitschrift ist...

- frei zugänglich
- zugänglich für Nutzer innerhalb des Campusnetzes der Universität Mainz
- nicht zugänglich (aber i.d.R. Zugang zu den Inhaltsverzeichnissen)

Informationen zur Zeitschrift (u.a. zu den Zugangsbedingungen)

Bitte beachten Sie die [Nutzungsbedingungen](#) des Verlages/Herausgebers.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

- 1-800 FLOWERS.COM, Inc. SWOT Analysis (via EBSCO Host)...
- 1-800 FLOWERS.COM, Inc. SWOT Analysis (via EBSCO Host)
- 1. Mose 2, 25
- 10/90 Report on Health Research, The
- 1000 und 1 Buch: Das österreichische Magazin für Kinder und Jugendli
- Morphologia
- 1585 - Business Journal Deutsche Börse Group
- 16 de Abril: Revista Cubana de los Estudiantes de las Ciencias Médic
- 16 Renford Road
- 1611: Revista de Historia de la Traducción
- 1750 Krónur Gefins
- 1833: Ou L' Année de la Mère
- 1895: Revue de l'Association Française de Recherche sur l'Histoire du
- 19820
- 19. Juni
- 19th (Nineteenth) Century Music (ältere Jahrgänge via JSTOR)
- 19th (Nineteenth) Century Music (aktuelle Jahrgänge)
- 1st Colonial Bancorp, Inc. SWOT Analysis (via EBSCO Host)
- 1steln
- 20 Century British History (via ProQuest)
- 20th Century Women: The E-Journal of First Person Biography

The screenshot displays the homepage of the Universitätsbibliothek Mainz. At the top, there is a navigation bar with links for 'Home', 'Suche', 'A-Z', 'Sitemap', and 'Kontakt'. Below this, a main header area contains the library's name and a grid of service categories:

- Bereichsbibliotheken:** Physik, Mathematik, Chemie · SB II · Theologie · Philosophicum · Fachbibliothek Medizin
- Literatur suchen:** Fachinformation, Datenbanken - DBIS, Ich suche ein Buch..., Literaturverwaltung
- Kataloge:** Online-Katalog, Kataloge weltweit - KVK, Zeitschriften deutschlandweit - ZDB, Elektronische Zeitschriften - EZB, Hochschulpublikationsserver - ArchiMed, Universitätsbibliografie
- Leihen und bestellen:** Ausleihe, Fernleihe, Bestelldienst OÜlVer, KatalogPortal Mainz
- Lernen:** Tutorials, Führungen, Kurse, ReaderPlus
- Aktuell:** RSS-Feed abonnieren, Abgabe von Dissertationen - Tutorial, Öffnungszeiten an Weihnachten und zum Jahreswechsel, Shakespeare-Bildarchiv Ooppel-Hammerschmidt, Citavi für Studierende, Zu Weihnachten
- Spezielle Sammlungen:** Frankreichforschung, USA-Bibliothek
- Suche im KatalogPortal Mainz:** Includes a search input field and a 'Direksuche' button.

10.05.2012

Dosisbezogener Referenzbereich

Haen et al. 2008, Brünen et al. 2008

$$C = \frac{D \times F}{T \times Cl_t}$$

c = Konzentration

D = Dosierung

F = Bioverfügbarkeit

T = Dosierungsintervall

Cl_t = totale Clearance

- Plausibilität der Spiegel zur Dosis
- Individuelle Veränderung des Arzneimittelmetabolismus
- Compliance-Überprüfung

Table 4 Total clearance (Cl_t), bioavailability (F), dosing intervals (τ) and factors (C/D_{low} and C/D_{high}) for calculation of dose-related plasma concentrations (C/D) for psychotropic drugs.

Drug	n	$Cl_t - SD - Cl_t + SD$ [mL/min]	F	τ [h]	C/D_{low} [ng/mL/mg]	C/D_{high} [ng/mL/mg]	Reference
Antidepressant drugs							
Amitriptyline	8	198–373	0.5	24	1.03	1.68	[165]
Amitriptyline oxide	12	331–539	0.8	24	0.93	1.75	[384]
Bupropion	17	2 500–11 300	1.0	24	0.06	0.28	[665]
Citalopram	8	367–545	0.8	24	1.02	1.51	[616]
Clomipramine	9	583–933	0.5	24	0.37	0.60	[198]
Desipramine	12	1 633–2 333	0.5	24	0.15	0.21	[2]
Desvenlafaxine	7	233–396	1.0	24	1.75	2.98	[520]
Dothiepin = Dosulepin	22	674–3 960	0.3	24	0.05	0.31	[740]
Doxepin	85	769–2 644	1.0	24	0.18	0.27	[100]
Duloxetine	12	610–1 733	0.5	24	0.20	0.57	[600]
Escitalopram	24	360–960	0.8	24	0.58	1.54	[607]
Fluoxetine	n. r.	600–833	0.7	24	0.60	0.83	[18]
Fluvoxamine	6	807–1 960	1.0	24	0.35	0.86	[163]
Imipramine	n. r.	791–1 029	0.4	24	0.28	0.37	[100]
Maprotiline	6	503–1 747	0.8	24	0.32	1.10	[415]
Mianserin	n. r.	843–1 948	0.3	24	0.11	0.25	[137]
Mirtazapine	10	455–945	0.5	24	0.37	0.85	[651]
Nordoxepin	85	504–2 738	1.0	24	0.25	1.38	[445]
Nortriptyline	n. r.	300–1 117	0.5	24	0.31	1.16	[664]
Paroxetine	30	1 561–10 856	1.0	24	0.06	0.44	[213]
Reboxetine	n. r.	22–51	1.0	24	12.55	31.10	[141]
Sertraline	11 (m)	1 313–2 213 (m)	1.0	24	0.31	0.53	[565]
	11 (f)	793–2 357 (f)	1.0	24	0.29	0.88	
Trazodone	8	73–103	1.0	24	6.72	9.47	[473]
Trimipramine	12	898–1 215	0.40	24	0.23	0.31	[165, 364]
Venlafaxine	18	747–1 540	1.0	24	0.45	0.93	[372]
O-Desmethylvenlafaxine		315–618	1.0	24	1.12	2.2	

Dosisbezogener Referenzbereich

Haen et al. 2008, Brünen et al. 2008

Wirkstoff	Faktor u	Faktor d	Dosis	untere Grenze	obere Grenze
Amisulprid	0,5	0,67		0	0
Amitriptylin	0,93	1,75		0	0
Amitriptylin-Oxid	1,03	1,68		0	0
Aripiprazol	8,63	12,85		0	0
Citalopram	1,02	1,51		0	0
Clomipramin	0,37	0,6		0	0
Clozapin	0,48	1,35		0	0
Desipramin	0,15	0,21		0	0
Doxepin	0,08	0,27		0	0
Duloxetin	0,2	0,57		0	0
Escitalopram	0,58	1,54		0	0
Haloperidol	0,61	0,99		0	0
Imipramin	Datenlage unzureichend			Datenlage unzureichend	
Lamotrigin	14,09	31,28		0	0
Maprotilin	0,32	1,1		0	0
MHD (10-OH-Carbazepin)	7,26	17,66		0	0
Mirtazapin	0,37	0,76		0	0
Nordoxepin	0,08	0,41		0	0
Nortriptylin	0,31	1,16		0	0
O-Desmethylvenlafaxin	1,12	2,2		0	0
Olanzapin	0,87	2,38		0	0
Oxcarbazepin	0,14	0,41		0	0
Perazin	Datenlage unzureichend			Datenlage unzureichend	
Quetiapin	0,29	0,61		0	0
Risperidon oral (akt. Fraktion)	2,68	5,04		0	0
Risperidon Depot (akt. Fraktion)	0,29	0,55		0	0
Trimipramin	0,17	0,55		0	0
Venlafaxin	0,45	0,93	375	168,75	348,75
Ziprasidon	0,55	1,36		0	0
Fluoxetin	0,84	5,90		0	0
Fluvoxamin	0,30	0,61		0	0
Paroxetin	0,41	2,50		0	0
Sertralin	0,23	0,38		0	0
Reboxetin	9,92	20,833		0	0

Pharmakokinetik-Software

- Visualisierung des zeitlichen Verlaufs
- Hintergründe verstehen
- Verstehen individueller Unterschiede
- Bioverfügbarkeit, Verteilung, Clearance, ...
- Programme visualisieren Plasmakonzentrationszeitverlauf

Therapeutischer Referenzbereich

Die Neunfeldertafel

Darstellung Referenz	Drugs and active metabolites	Therapeutic reference range/recommended drug concentration	t1/2	Laboratory alert level	Level of recommen- dation to use TDM (consensus)		
Konzentration in Relation zum dosisbezogenen Referenzbereich	Antidepressant drugs						
	zu niedrig 1	Agomelatine	7–300 ng/mL 1–2 h after 50 mg	1–2 h	600 ng/mL	4	
		Amitriptyline plus nortriptyline	80–200 ng/mL	10–28 h 30 h	300 ng/mL	1	Enzyme Arzneistoffe
		Bupropion plus hydroxybupropion	225–1 500 ng/mL	8–26 h 17–47 h	2 000 ng/mL	3	
	passend 2	Citalopram	50–110 ng/mL	33 h	220 ng/mL	2	
		Clomipramine plus nortclo- mipramine	230–450 ng/mL	16–60 h 36 h	450 ng/mL	1	
		Desipramine	100–300 ng/mL	15–18 h	300 ng/mL	2	
		Desvenlafaxine	100–400 ng/mL	11 h	600 ng/mL	2	
		Dosulepin = Dothiepin	45–100 ng/mL	18–21 h	200 ng/mL	2	Enzyme Arzneistoffe
		Doxepin plus nordoxepin	50–150 ng/mL	15–20 h	300 ng/mL	2	Enzyme Arzneistoffe
	zu hoch 3	Duloxetine	30–120 ng/mL	9–19 h	240 ng/mL	2	
		Escitalopram	15–80 ng/mL	30 h	160 ng/mL	2	Enzyme Arzneistoffe
		Fluoxetine plus norfluoxetine	120–500 ng/mL	4–6 days 4–16 days	1 000 ng/mL	2	
		Fluvoxamine	60–230 ng/mL	20 h	500 ng/mL	2	
		Imipramine plus desipramine	175–300 ng/mL	11–25 h 15–18 h	300 ng/mL	1	
Maprotiline		75–130 ng/mL	20–58 h	220 ng/mL	2		
Mianserin		15–70 ng/mL	14–33 h	140 ng/mL	3		
Milnacipran	50–110 ng/mL	5–8 h	220 ng/mL	2			
Mirtazapine	30–80 ng/mL	20–40 h	160 ng/mL	2	Enzyme Arzneistoffe		
Moclobemide	300–1 000 ng/mL	2–7 h	2 000 ng/mL	3			

Fallbeispiel 1

Patienten/Auftrags.-Nr.

Geschlecht: weiblich Geb.: 24.02.1962

Medikament(e): Venlafaxin

Dosis: 150 mg/d

Seit wann: seit Wochen

Letzte Einnahme: vor 12h

Begleitmedikamente: Elontril 150 mg/d

 Nichtraucher • Raucher (mäßig, < 10 Zig/Tag) • Raucher (stark, > 10 Zig/Tag)**GRUND DER ANFORDERUNG** (Zutreffendes bitte ankreuzen, siehe auch Hinweise für Einsender)

- Ersteinstellung • Dosisänderung • Umstellung der Medikation
- Nichtansprechen • Compliance-Kontrolle • Nebenwirkung (bitte unten spezifizieren)
- Verlaufskontrolle • anderer Grund (bitte spezifizieren)
- Sonderuntersuchung (bitte spezifizieren)

SCHWEREGRAD DER ERKRANKUNG (nach CGI, siehe Hinweise für Einsender)

- nicht beurteilbar • nicht krank • Grenzfall • leicht krank • mäßig krank
- deutlich krank • schwer krank • extrem schwer krank

THERAPIE-EFFEKT (nach CGI, siehe Hinweise für Einsender)

- sehr gut • mäßig • gering • unverändert oder verschlechtert • nicht beurteilbar

NEBENWIRKUNGEN (nach UKU): keine • leicht • mittel • schwer

- Schläfrigkeit/Sedierung • Spannung/innere Unruhe • Akkomodationsstörungen
- Hauterscheinungen • Speichelfluss (erhöht/verringert) • Polydipsie
- EPS-Nebenwirkungen (Dystonie/Rigidität/Hypokinese/Akinese) • Tremor • Akathisie
- kardiovaskuläre Störung (orthostatische Dysregulation/Tachykardie)
- gastrointestinale Störungen (Übelkeit/Erbrechen/Nausea/Diarrhoe/Obstipation) • Gewichtszunahme
- urogenitale Störungen (Miktionsstörung/sexuelle Dysfunktion/Polyurie)-
- andere Nebenwirkung (bitte spez.)

Zusammenhang mit dem zu analysierenden Medikament: • wahrscheinlich • möglich • unwahrscheinlich

Datum

Behandelnde/r Arzt/ Ärztin

ERGEBNISSE (ng/ ml) und BEURTEILUNG

Blutspiegel: • im therapeutisch üblichen Bereich • zu niedrig • zu hoch
Empfehlung: Dosis • beibehalten • erhöhen • reduzieren auf mg/Tag

Datum

Unterschrift (Labor)

VEN: 715 ng/ml

OD-VEN: 104 ng/ml

Summe: 819 ng/ml

Therapeutischer Bereich:

100-400 ng/ml

Dosisbezogener Bereich:

68-140 ng/ml

Fig. 3. Relationship between CYP2D6 genotype and ratios of concentrations *O*-desmethylvenlafaxine (ODV)/venlafaxine (V) under steady-state treatment with venlafaxine. PM, poor metabolizers who had two mutant alleles of CYP2D6; IM, intermediate metabolizers who had one active and one mutant allele (*1/*4); EMs, extensive metabolizers who had two active alleles (*1/*1); UMs, ultra rapid metabolizers who had one active and one duplicated active allele (2x*1)/*1. ** $P < 0.01$, PM vs. EM and UM vs. EM, * $P < 0.05$, IM vs. EM.

Verhältnis von VEN/OD-VEN zur Beurteilung des Metabolisierungsstatus

- ~~▪ $> 1/1$ → Poor metabolizer~~ ???
- ~~▪ $1/3$ bis $1/6$ → Extensive metabolizier~~
- $1/9$ bis $1/11$ → Ultrarapid metabolizer

Inhibiting drugs	Inhibited enzymes
Amiodarone	CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4
Bupropion	CYP2D6

Hiemke et al.: AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry: Update 2011; *Pharmacopsychiatr* 2011;44: 195–235

Bupropion (Psychopharmakon) ↔ Venlafaxin (Psychopharmakon)

Effekt:

Pharmakodynamische Interaktion:

Erwünschte additive Wirkung:

mögliche Verbesserung der antidepressiven Wirksamkeit durch die Kombination aus einem selektiven Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (Venlafaxin) mit einem selektiven Dopamin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (Bupropion).

Risiken:

Die jeweiligen unerwünschten Arzneimittelwirkungen, (s. die aktuellen Fachinformationen), die bei beiden Substanzen gemeinsam auftreten können wie Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Schlafstörungen, Agitiertheit, Unruhe, Angst, Hypertonie, gastrointestinale Störungen einschließlich Übelkeit und Erbrechen, Schwitzen, cerebrale Krampfanfälle (v.a. potenziell ausgelöst durch Bupropion), können sich additiv verstärken. Dieser pharmakodynamische Additionseffekt wird potenziert durch den Hemmeffekt, den das Bupropion auf den Abbau von Venlafaxin ausübt (s.u.).

Pharmakokinetische Interaktion:

Eine kleine klinische Studie (8 Patienten) zeigte eine Verdoppelung der Venlafaxinkonzentration mit dieser Kombination (150-375 mg Venlafaxin plus 150 mg Bupropion); eine signifikante Veränderung des metabolischen Quotienten: Venlafaxin/O-Desmethylvenlafaxin wurde gemessen.

Mechanismus:

Pharmakodynamisch handelt es sich um mögliche synergistisch additive Effekte.

Pharmakokinetisch ist der starke Hemmeffekt von Bupropion auf den Abbau von Venlafaxin bedeutsam. Bupropion ist ein potenter Inhibitor von CYP2D6, Venlafaxin ist in seiner Metabolisierung von CYP2D6 relevant abhängig.

Bewertung:

Kritische Kombination bei Risikopatienten

Die Kombination kann hilfreich sein bei Therapieresistenz, auch eine Verringerung von eventuellen sexuellen Funktionsstörungen unter Venlafaxin ist möglich (das konnten Kennedy SH et al, 2002, zeigen).

Es handelt sich aber dennoch v.a. bei hohen Venlafaxindosen (v.a. > 225 mg/d) und bei UAW-empfindlichen bzw. somatisch vorgeschädigten Patienten um eine Risikokombination, die nur durch sorgfältige klinische Beobachtung und Überwachung des Venlafaxinspiegels suffizient kontrolliert werden kann.

Vorgehensweise:

Kombination unter Kontrolle der Blutspiegel anwenden

Eine sorgfältige Dosisanpassung von Venlafaxin ist erforderlich. Kombination unter Spiegelkontrolle von Venlafaxin (empfohlener Referenzbereich: Venlafaxin + O-Desmethylvenlafaxin 195-400 ng/ml).

Patienten/Auftrags.-Nr.

Geschlecht: weiblich Geb.:24.02.1962

Medikament(e): Venlafaxin

Dosis: 150 mg/d

Seit wann: seit Wochen

Letzte Einnahme: vor 12h

Begleitmedikamente: Elontril 150 mg/d

X Nichtraucher • Raucher (mäßig, < 10 Zig/Tag) • Raucher (stark, > 10 Zig/Tag)**GRUND DER ANFORDERUNG** (Zutreffendes bitte ankreuzen, siehe auch Hinweise für Einsender)

- Ersteinstellung • Dosisänderung • Umstellung der Medikation
- Nichtansprechen • Compliance-Kontrolle • Nebenwirkung (bitte unten spezifizieren)
- X** Verlaufskontrolle • anderer Grund (bitte spezifizieren)
- Sonderuntersuchung (bitte spezifizieren)

SCHWEREGRAD DER ERKRANKUNG (nach CGI, siehe Hinweise für Einsender)

- nicht beurteilbar • nicht krank • Grenzfall • leicht krank • mäßig krank
- deutlich krank **X** schwer krank • extrem schwer krank

THERAPIE-EFFEKT (nach CGI, siehe Hinweise für Einsender)

- sehr gut **X** mäßig • gering • unverändert oder verschlechtert • nicht beurteilbar

NEBENWIRKUNGEN (nach UKU): **X** keine • leicht • mittel • schwer

- Schläfrigkeit/Sedierung • Spannung/innere Unruhe • Akkomodationsstörungen
- Hauterscheinungen • Speichelfluss (erhöht/verringert) • Polydipsie
- EPS-Nebenwirkungen (Dystonie/Rigidität/Hypokinese/Akinese) • Tremor • Akathisie
- kardiovaskuläre Störung (orthostatische Dysregulation/Tachykardie)
- gastrointestinale Störungen (Übelkeit/Erbrechen/Nausea/Diarrhoe/Obstipation) • Gewichtszunahme
- urogenitale Störungen (Miktionsstörung/sexuelle Dysfunktion/Polyurie)-
- andere Nebenwirkung (bitte spez.)

Zusammenhang mit dem zu analysierenden Medikament: • wahrscheinlich • möglich • unwahrscheinlich

Datum Behandelnde/r Arzt/ Ärztin

ERGEBNISSE (ng/ ml) und BEURTEILUNG

Blutspiegel: • im therapeutisch üblichen Bereich • zu niedrig • zu hoch
Empfehlung: Dosis • beibehalten • erhöhen • reduzieren auf mg/Tag

Datum Unterschrift (Labor)

VEN: 715 ng/ml

OD-VEN: 104 ng/ml

Summe: 819 ng/ml

Therapeutischer Bereich:

100-400 ng/ml

Dosisbezogener Bereich:

68-140 ng/ml

Befund:

- Spiegel zu hoch, auch für die Dosis
- VEN im Verhältnis zum Metaboliten viel zu hoch
- Interaktion: Bupropion hemmt den Abbau über CYP2D6
- CAVE: Na-Entgleisung möglich → regelmäßige Na und EKG-Kontrollen
- Insofern NW auftreten Dosis reduzieren

Fallbeispiel 2

Patienten/Auftrags.-Nr. Geschlecht: **männlich** Geb.: **21.08.1949**
 Diagnose: **F25.0**
stationär

Medikament(e): Seroquel prolong 800 mg/d

Seit wann: 2 Wochen

Letzte Einnahme: 12h

Begleitmedikamente: Timonil 2*300 mg

- **Nichtraucher** • **Raucher (mäßig, < 10 Zig/Tag)** • **R aucher (stark, > 10 Zig/Tag)**

GRUND DER ANFORDERUNG (Zutreffendes bitte ankreuzen, siehe auch Hinweise für Einsender)

- Ersteinstellung • Dosisänderung • Umstellung der Medikation
- Nichtansprechen • Compliance-Kontrolle • Nebenwirkung (bitte unten spezifizieren)
- Verlaufskontrolle • anderer Grund (bitte spezifizieren)
- Sonderuntersuchung (bitte spezifizieren)

SCHWEREGRAD DER ERKRANKUNG (nach CGI, siehe Hinweise für Einsender)

- nicht beurteilbar • nicht krank • Grenzfall • leicht krank • mäßig krank
- deutlich krank schwer krank • extrem schwer krank

THERAPIE-EFFEKT (nach CGI, siehe Hinweise für Einsender)

- sehr gut • mäßig gering • unverändert oder verschlechtert • nicht beurteilbar

NEBENWIRKUNGEN (nach UKU): keine • leicht • mittel • schwer

- Schläfrigkeit/Sedierung • Spannung/innere Unruhe • Akkomodationsstörungen
- Hauterscheinungen • Speichelfluss (erhöht/verringert) • Polydipsie
- EPS-Nebenwirkungen (Dystonie/Rigidität/Hypokinese/Akinese) • Tremor • Akathisie
- kardiovaskuläre Störung (orthostatische Dysregulation/Tachykardie)
- gastrointestinale Störungen (Übelkeit/Erbrechen/Nausea/Diarrhoe/Obstipation) • Gewichtszunahme
- urogenitale Störungen (Miktionsstörung/sexuelle Dysfunktion/Polyurie)-
- andere Nebenwirkung (bitte spez.)

Zusammenhang mit dem zu analysierenden Medikament: • wahrscheinlich • möglich • unwahrscheinlich

Datum **Behandelnde/r Arzt/ Ärztin**

ERGEBNISSE (ng/ ml) und BEURTEILUNG

Blutspiegel: • im therapeutisch üblichen Bereich • zu niedrig • zu hoch
 Empfehlung: Dosis • beibehalten • erhöhen • reduzieren auf mg/Tag

Datum **Unterschrift (Labor)**

QUE: 200 ng/ml

Therapeutischer Bereich:

100-500 ng/ml

Dosisbezogener Bereich:

230-490 ng/ml

Pharmakodynamik

- In erster Linie Blockade von H_1 -Rezeptoren, schwächer von $5-HT_2$ -, $5-HT_1$ -, D_1 -, D_2 -, D_3 - und α_1 -Rezeptoren; keine klinisch relevante Affinität zu D_4 -, α_2 - und mACh-Rezeptoren.
- Der aktive Metabolit *N-Desalkylquetiapin* (*Norquetiapin*) blockiert neben D_2 -artigen Rezeptoren nach neueren Studien auch den Noradrenalintransporter (NA-Wiederaufnahmehemmung) sowie $5-HT_{2A}$ - und $5-HT_{2C}$ -Rezeptoren. Muttersubstanz und Metabolit zeigen zumindest schwache partialagonistische Effekte an $5-HT_{1A}$ -Rezeptoren.

Pharmakokinetik

- Extensive hepatische Metabolisierung nahezu ausschließlich über CYP3A4 (► Kap. 17) mit etwa 20 zumeist pharmakologisch inaktiven und 3 wahrscheinlich aktiven Metaboliten (v. a. *N-Desalkylquetiapin* mit möglicher Wirksamkeit). Weniger als 5% der Muttersubstanz werden unverändert mit dem Urin oder den Faeces ausgeschieden.
- *N-Desalkylquetiapin* wird primär über CYP3A4 gebildet und abgebaut.
- T_{max} = ca. 1,5 h (Retardtablette 6 h); $t_{1/2}$ = ca. 7 h (*N-Desalkylquetiapin* ca. 12 h; bei älteren Patienten verlängert); orale Bioverfügbarkeit nur ca. 9%; Plasmaproteinbindung 83%.

Carbamazepin (Psychopharmakon) Quetiapin (Psychopharmakon) - PsiacOnline - Interaktionscomputer für die Psychiatrie - Mozilla Firefox

http://www.psiac.de/index.php?page=InteractionPage&interactionID=5580

Sie sind angemeldet als Sonja Brünen. Abmelden

PsiacOnline
Interaktionscomputer für die Psychiatrie

Startseite MeinPsiac Interaktionen Wirkstoffe Handelsnamen

Carbamazepin (Psychopharmakon) ↔ Quetiapin (Psychopharmakon)

Effekt:

1. Wirkabschwächung von Quetiapin

Mechanismus:

1. Carbamazepin ist ein starker Induktor des Cytochrom-P450-Isoenzym 3A4, welches auch den Hauptstoffwechselweg von Quetiapin darstellt. Hierdurch kommt es zu einem Anstieg der Quetiapin-clearance; 2. Substrathemmung des CYP3A4 für Carbamazepin durch Quetiapin

Bewertung:

Kombination mit erhöhtem Risiko einer Interaktions-UAW

In einer Pharmakokinetikstudie führte die gleichzeitige Verabreichung von Carbamazepin zu einem signifikanten Anstieg der Quetiapin-Clearance. Dies reduzierte die systemische Exposition gegenüber Quetiapin, gemessen anhand der AUC, auf 13% und weniger. Grimm et al beschreiben eine Abnahme des Cmax von Quetiapin um 80% und eine Steigerung der Quetiapin-Clearance um das 7,5-fache. Solche Prozesse können die antipsychotische Wirksamkeit von Quetiapin schmälern, ggf. auch zum Wirkverlust führen. Das Risiko der Kombination besteht daher im wesentlichen im WIRKVERLUST.

Vorgehensweise:

Kombination vermeiden

Kontrolle der Konzentrationen von Quetiapin und Carbamazepin im Blut; Dosiserhöhung des Quetiapins und/oder Dosisermiedrigung des Carbamazepin. Absetzen von Carbamazepin nur ausschleichend, dabei auf möglichen Konzentrationsanstieg von Quetiapin und dessen klinische Folgen achten.

Metadaten:

Autoren: Prof. Dr. Dr. Ekkehard Haen
Literatur: Wong YWF, Ewing BJ, Thyrum PT, Yeh C. The effect of phenytoin and cimetidine on the pharmacokinetics of Seroquel. Schizophr Res (1997) 24, 200-1; Grimm et al (2005): Br J Clin Pharmacol 61: 58-69; Seroquel (Quetiapine): in Stockley's Drug Interactions, 6th Edition, Pharmaceutical Press, London 2002, pp 732-733, p 323; AstraZeneca. Summary of product characteristics, October 2001; Fachinformation Quetiapin Mai 2001; Castberg et al. (2007) Quetiapine and drug interactions: evidence from a routine therapeutic drug monitoring service. J Clin Psychiatry 68:1540-1545.
Letzte Änderung: 04.02.2009, 11:22 Uhr

Figure 1 Mean ($\pm$ SEM) plasma quetiapine concentrations

IR: immediate-release quetiapine 150 mg twice daily
SR: sustained-release quetiapine 300 mg once daily

Patienten/Auftrags.-Nr. Geschlecht: **männlich** Geb.: **21.08.1949**
Diagnose: **F25.0**
stationär

Medikament(e): Seroquel prolong 800 mg/d

Seit wann: 2 Wochen

Letzte Einnahme: 12h

Begleitmedikamente: Timonil 2*300 mg

• **Nichtraucher** • **Raucher (mäßig, < 10 Zig/Tag)** • **R aucher (stark, > 10 Zig/Tag)**

GRUND DER ANFORDERUNG (Zutreffendes bitte ankreuzen, siehe auch Hinweise für Einsender)

- Ersteinstellung • Dosisänderung • Umstellung der Medikation
- Nichtansprechen • Compliance-Kontrolle • Nebenwirkung (bitte unten spezifizieren)
- Verlaufskontrolle • anderer Grund (bitte spezifizieren)
- Sonderuntersuchung (bitte spezifizieren)

SCHWEREGRAD DER ERKRANKUNG (nach CGI, siehe Hinweise für Einsender)

- nicht beurteilbar • nicht krank • Grenzfall • leicht krank • mäßig krank
- deutlich krank schwer krank • extrem schwer krank

THERAPIE-EFFEKT (nach CGI, siehe Hinweise für Einsender)

- sehr gut • mäßig gering • unverändert oder verschlechtert • nicht beurteilbar

NEBENWIRKUNGEN (nach UKU): keine • leicht • mittel • schwer

- Schläfrigkeit/Sedierung • Spannung/innere Unruhe • Akkomodationsstörungen
- Hauterscheinungen • Speichelfluss (erhöht/verringert) • Polydipsie
- EPS-Nebenwirkungen (Dystonie/Rigidität/Hypokinese/Akinese) • Tremor • Akathisie
- kardiovaskuläre Störung (orthostatische Dysregulation/Tachykardie)
- gastrointestinale Störungen (Übelkeit/Erbrechen/Nausea/Diarrhoe/Obstipation) • Gewichtszunahme
- urogenitale Störungen (Miktionsstörung/sexuelle Dysfunktion/Polyurie)-
- andere Nebenwirkung (bitte spez.)

Zusammenhang mit dem zu analysierenden Medikament: • wahrscheinlich • möglich • unwahrscheinlich

Datum Behandelnde/r Arzt/ Ärztin

ERGEBNISSE (ng/ ml) und BEURTEILUNG

Blutspiegel: • im therapeutisch üblichen Bereich • zu niedrig • zu hoch
Empfehlung: Dosis • beibehalten • erhöhen • reduzieren auf mg/Tag

Datum Unterschrift (Labor)

Beurteilung: **200 ng/ml**

Therapeutische Bereich: Spiegel im therapeutischen Bereich

Bei Quetiapin prolong ist der Talspiegel erst nach 24h erreicht, der errechnete Talspiegel liegt unter dem therapeutischen Bereich

Dosisbezogener Bereich:

230-490 ng/ml

• Der Spiegel ist zu niedrig für die Dosis

- Carbamazepin ist ein potenter Induktor von CYP3A4, welches auch den Hauptstoffwechselweg von Quetiapin darstellt
- Wenn möglich einen anderen Mood-Stabilizer wählen: Absetzen von Carbamazepin nur ausschleichend, dabei auf möglichen Konzentrationsanstieg von Quetiapin und dessen klinische Folgen achten

Fallbeispiel 3

Patienten/Auftrags.-Nr. Geschlecht: weiblich Geb.: 25.02.1967
Diagnose: F20.0
ambulant

Medikament(e): Amisulprid 800 mg/d

Seit wann: seit 6 Tagen

Letzte Einnahme: vor 12h

Begleitmedikamente:

• Nichtraucher • Raucher (mäßig, < 10 Zig/Tag) Raucher (stark, > 10 Zig/Tag)

GRUND DER ANFORDERUNG (Zutreffendes bitte ankreuzen, siehe auch Hinweise für Einsender)

- Ersteinstellung • Dosisänderung • Umstellung der Medikation
- Nichtansprechen • Compliance-Kontrolle • Nebenwirkung (bitte unten spezifizieren)
- Verlaufskontrolle • anderer Grund (bitte spezifizieren)
- Sonderuntersuchung (bitte spezifizieren)

SCHWEREGRAD DER ERKRANKUNG (nach CGI, siehe Hinweise für Einsender)

- nicht beurteilbar • nicht krank • Grenzfall • leicht krank mäßig krank
- deutlich krank • schwer krank • extrem schwer krank

THERAPIE-EFFEKT (nach CGI, siehe Hinweise für Einsender)

- sehr gut mäßig • gering • unverändert oder verschlechtert • nicht beurteilbar

NEBENWIRKUNGEN (nach UKU): • keine • leicht • mittel • schwer

- Schläfrigkeit/Sedierung • Spannung/innere Unruhe • Akkomodationsstörungen
- Hauterscheinungen • Speichelfluss (erhöht/verringert) • Polydipsie
- EPS-Nebenwirkungen (Dystonie/Rigidität/Hypokinese/Akinese) • Tremor • Akathisie
- kardiovaskuläre Störung (orthostatische Dysregulation/Tachykardie)
- gastrointestinale Störungen (Übelkeit/Erbrechen/Nausea/Diarrhoe/Obstipation) • Gewichtszunahme
- urogenitale Störungen (Miktionsstörung/sexuelle Dysfunktion/Polyurie)-
- andere Nebenwirkung (bitte spez.)

Zusammenhang mit dem zu analysierenden Medikament: • wahrscheinlich • möglich • unwahrscheinlich

Datum Behandelnde/r Arzt/ Ärztin

ERGEBNISSE (ng/ ml) und BEURTEILUNG

Blutspiegel: • im therapeutisch üblichen Bereich • zu niedrig • zu hoch
Empfehlung: Dosis • beibehalten • erhöhen • reduzieren auf mg/Tag

Datum Unterschrift (Labor)

AMS: 756 ng/ml

Therapeutischer Bereich:

100-320 ng/ml

Dosisbezogener Bereich:

400-535 ng/ml

Pharmakodynamik

- Selektive Blockade von D_2 -artigen Rezeptoren ($D_2 = D_3 > D_4$) mit überwiegender Anreicherung im mesolimbischen und tuberoinfundibulären, weniger im nigrostriatalen System. Keine nachweisbare Affinität zu D_1 - und nichtdopaminergen Rezeptoren.
- Wirkung bei Negativsymptomatik und Depression unter niedriger Dosierung vermutlich durch Blockade präsynaptischer Dopaminrezeptoren mit Steigerung der dopaminergen Transmission.

Pharmakokinetik

- $T_{\max} = \text{ca. } 2 \text{ h}$ mit biphasischem Verlauf bei Dosen über 100 mg;
 $t_{1/2} = 12\text{--}20 \text{ h}$; Bioverfügbarkeit 33–45%; Plasmaproteinbindung 17%.
- Keine pharmakologisch aktiven Metaboliten bei linearer Pharmakokinetik.
- Der Hauptanteil der Substanz wird unverändert renal ausgeschieden, daher Dosisreduktion bei verminderter Kreatinin-Clearance.
- Plasmakonzentration: 100–320 ng/ml^p.

Patienten-/Auftrags.-Nr. Geschlecht: weiblich Geb.: 25.02.1967
Diagnose: F20.0
ambulant

Medikament(e): Amisulprid 800 mg/d

Seit wann: seit 6 Tagen

Letzte Einnahme: vor 12h

Begleitmedikamente:

- Nichtraucher • Raucher (mäßig, < 10 Zig/Tag) **X** Raucher (stark, > 10 Zig/Tag)

GRUND DER ANFORDERUNG (Zutreffendes bitte ankreuzen, siehe auch Hinweise für Einsender)

- Ersteinstellung • Dosisänderung • Umstellung der Medikation
- Nichtansprechen • Compliance-Kontrolle • Nebenwirkung (bitte unten spezifizieren)
- X** Verlaufskontrolle • anderer Grund (bitte spezifizieren)
- Sonderuntersuchung (bitte spezifizieren)

SCHWEREGRAD DER ERKRANKUNG (nach CGI, siehe Hinweise für Einsender)

- nicht beurteilbar • nicht krank • Grenzfall • leicht krank **X** mäßig krank
- deutlich krank • schwer krank • extrem schwer krank

THERAPIE-EFFEKT (nach CGI, siehe Hinweise für Einsender)

- sehr gut **X** mäßig • gering • unverändert oder verschlechtert • nicht beurteilbar

NEBENWIRKUNGEN (nach UKU): • keine • leicht • mittel • schwer

- Schläfrigkeit/Sedierung • Spannung/innere Unruhe • Akkomodationsstörungen
- Hauterscheinungen • Speichelfluss (erhöht/verringert) • Polydipsie
- EPS-Nebenwirkungen (Dystonie/Rigidität/Hypokinese/Akinese) • Tremor • Akathisie
- kardiovaskuläre Störung (orthostatische Dysregulation/Tachykardie)
- gastrointestinale Störungen (Übelkeit/Erbrechen/Nausea/Diarrhoe/Obstipation) • Gewichtszunahme
- urogenitale Störungen (Miktionsstörung/sexuelle Dysfunktion/Polyurie)-
- andere Nebenwirkung (bitte spez.)

Zusammenhang mit dem zu analysierenden Medikament: • wahrscheinlich • möglich • unwahrscheinlich

Datum

Behandelnde/r Arzt/ Ärztin

ERGEBNISSE (ng/ ml) und BEURTEILUNG

Blutspiegel: • im therapeutisch üblichen Bereich • zu niedrig • zu hoch
Empfehlung: Dosis • beibehalten • erhöhen • reduzieren auf mg/Tag

Datum

Unterschrift (Labor)

AMS: 756 ng/ml

Therapeutischer Bereich:

100-320 ng/ml

Dosisbezogener Bereich:

400-535 ng/ml

Befund:

- Spiegel zu hoch, auch für die Dosis
- Insofern Tal Spiegelbedingungen gegeben, Nierenfunktion überprüfen, da Amisulprid renal abgebaut wird
- Dosis reduzieren und auf NW achten

Fallbeispiel 4

Patienten/Auftrags.-Nr.

Geschlecht: weiblich Geb.: 22.09.1966

Medikament(e): **Clomipramin 112,5 mg/d**
Fluoxetin Intoxikation mit 10-15 Tabletten (30 mg) vor 2 Tagen

Seit wann: **seit 3 Monaten**Letzte Einnahme: **vor 12h**Begleitmedikamente: **Lithium 1,5 Tabletten**

X Nichtraucher • Raucher (mäßig, < 10 Zig/Tag) • Raucher (stark, > 10 Zig/Tag)

GRUND DER ANFORDERUNG (Zutreffendes bitte ankreuzen, siehe auch Hinweise für Einsender)

- Ersteinstellung
- Dosisänderung
- Umstellung der Medikation
- Nichtansprechen
- Compliance-Kontrolle
- Nebenwirkung (bitte unten spezifizieren)
- X** Verlaufskontrolle
- anderer Grund (bitte spezifizieren)
- Sonderuntersuchung (bitte spezifizieren)

SCHWEREGRAD DER ERKRANKUNG (nach CGI, siehe Hinweise für Einsender)

- nicht beurteilbar
- nicht krank
- Grenzfall
- leicht krank
- X** mäßig krank
- deutlich krank
- schwer krank
- extrem schwer krank

THERAPIE-EFFEKT (nach CGI, siehe Hinweise für Einsender)

- sehr gut
- X** mäßig
- gering
- unverändert oder verschlechtert
- nicht beurteilbar

NEBENWIRKUNGEN (nach UKU):

- keine
- X** leicht
- mittel
- schwer
- Schläfrigkeit/Sedierung
- Spannung/innere Unruhe
- Akkomodationsstörungen
- Hauterscheinungen
- Speichelfluss (erhöht/verringert)
- Polydipsie
- EPS-Nebenwirkungen (Dystonie/Rigidität/Hypokinese/Akinese)
- Tremor
- Akathisie
- kardiovaskuläre Störung (orthostatische Dysregulation/Tachykardie)
- X** gastrointestinale Störungen (Übelkeit/Erbrechen/Nausea/Diarrhoe/Obstipation)
- Gewichtszunahme
- urogenitale Störungen (Miktionsstörung/sexuelle Dysfunktion/Polyurie)-
- andere Nebenwirkung (bitte spez.)

Zusammenhang mit dem zu analysierenden Medikament: • wahrscheinlich • möglich • unwahrscheinlich

Datum Behandelnde/r Arzt/ Ärztin

ERGEBNISSE (ng/ ml) und BEURTEILUNG

Blutspiegel: • im therapeutisch üblichen Bereich • zu niedrig • zu hoch
Empfehlung: Dosis • beibehalten • erhöhen • reduzieren auf mg/Tag

Datum Unterschrift (Labor)

CLOM: 307 ng/ml

NCLOM: 465 ng/ml

Summe: 772 ng/ml

Im zuvorigen Verlauf Spiegel im oberen therapeutischen Bereich

Therapeutischer Bereich:

230-450 ng/ml

Dosisbezogener Bereich:

40-70 ng/ml

FLUOX: 313 ng/ml

DFLUOX: 111 ng/ml

Summe: 424 ng/ml

Therapeutischer Bereich:

120-500 ng/ml

Dosisbezogener Bereich (Steady State):

250-1770 ng/ml

Clomipramin-Ratio

CLOM:DCLOM = 1:1,5

Fluoxetin-Ratio

Niedrige Dosis:

FLUOX:NFLUOX = 1:1,5 bis 1:1

Hohe Dosis:

FLUOX:NFLUOX = >1,5:1

Sie sind angemeldet als Sorja Brüner. Abmelden

Startseite MeinPsiac Interaktionen Wirkstoffe Handelsnamen

Clomipramin (Psychopharmakon) ↔ Fluoxetin (Psychopharmakon)

Effekt:

vermehrte anticholinerge Nebenwirkungen, Delir, migräneartige Anfälle (Einzelfallbericht) bis hin zur Intoxikation

Mechanismus:

Inhibition von CYP2D6 (Oxidation und N-Demethylierung) durch Fluoxetin oder Norfluoxetin, dadurch verminderter Abbau von Clomipramin: Anstieg des Clomipramin-Blutspiegels um ein Zwei bis Vierfaches

Bewertung:

CAVE, Kombination mit Risiko einer schwerwiegenden Interaktions-UAW

Vorgehensweise:

Kombination unter Kontrolle der Blutspiegel anwenden

besondere Beachtung der langen Halbwertszeit von Norfluoxetin (Metabolit): 7-15 Tage, so dass die Interaktion auch nach Absetzen von Fluoxetin fortbestehen kann

Metadaten:

Autor: Prof. Dr. Christoph Hiemke

Literatur: Balant-Gorgia et al. Pharmacopsychiatry (1996) 29, 38-41

Letzte Änderung: 16.12.2004, 00:00 Uhr

Kommentieren

Drucken

Patienten/Auftrags.-Nr.

Geschlecht: weiblich Geb.:22.09.1966

Medikament(e): Clomipramin 112,5 mg/d
Fluoxetin Intoxikation mit 10-15 Tabletten (30 mg) vor 2 Tagen

Seit wann: seit 3 Monaten

Letzte Einnahme: vor 12h

Begleitmedikamente: Lithium 1,5 Tabletten

X Nichtraucher • Raucher (mäßig, < 10 Zig/Tag) • Raucher (stark, > 10 Zig/Tag)

GRUND DER ANFORDERUNG (Zutreffendes bitte ankreuzen, siehe auch Hinweise für Einsender)

- Ersteinstellung • Dosisänderung • Umstellung der Medikation
- Nichtansprechen • Compliance-Kontrolle • Nebenwirkung (bitte unten spezifizieren)
- X** Verlaufskontrolle • anderer Grund (bitte spezifizieren)
- Sonderuntersuchung (bitte spezifizieren)

SCHWEREGRAD DER ERKRANKUNG (nach CGI, siehe Hinweise für Einsender)

- nicht beurteilbar • nicht krank • Grenzfall • leicht krank **X** mäßig krank
- deutlich krank • schwer krank • extrem schwer krank

THERAPIE-EFFEKT (nach CGI, siehe Hinweise für Einsender)

- sehr gut **X** mäßig • gering • unverändert oder verschlechtert • nicht beurteilbar

NEBENWIRKUNGEN (nach UKU):

- keine **X** leicht • mittel • schwer
- Schläfrigkeit/Sedierung • Spannung/innere Unruhe • Akkomodationsstörungen
- Hauterscheinungen • Speichelfluss (erhöht/verringert) • Polydipsie
- EPS-Nebenwirkungen (Dystonie/Rigidität/Hypokinese/Akinese) • Tremor • Akathisie
- kardiovaskuläre Störung (orthostatische Dysregulation/Tachykardie)
- X** gastrointestinale Störungen (Übelkeit/Erbrechen/Nausea/Diarrhoe/Obstipation) • Gewichtszunahme
- urogenitale Störungen (Miktionsstörung/sexuelle Dysfunktion/Polyurie)-
- andere Nebenwirkung (bitte spez.)

Zusammenhang mit dem zu analysierenden Medikament: • wahrscheinlich • möglich • unwahrscheinlich

Datum Behandelnde/r Arzt/ Ärztin

ERGEBNISSE (ng/ ml) und BEURTEILUNG

Blutspiegel: • im therapeutisch üblichen Bereich • zu niedrig • zu hoch
Empfehlung: Dosis • beibehalten • erhöhen • reduzieren auf mg/Tag

Datum Unterschrift (Labor)

Befund:
CLOM: 307 ng/ml

Clomipramin ng/ml

- Spiegel 772 ng/ml hoch, auch für die Dosis
- Im zuvorigen Verlauf Spiegel im oberen therapeutischen Bereich
- CLOM liegt im Erwartungsbereich

Therapeutischer Bereich:

- CLOM-Abbau über CYP2D6 zum 230-450 ng/ml nicht bestimmten

Dosisbezogener Bereich: durch Fluoxetin gehemmt
40-70 ng/ml

- Dosis sollte reduziert werden
- Sorgfältige klinische Überwachung

FLUOX: 313 ng/ml

Fluoxetin: 111 ng/ml

D-FLUOX: 124 ng/ml

- Spiegel passt zur angegebenen Intoxikationsmenge

Therapeutischer Bereich:

- Aufgrund der langen HWZ und Autolimitation kann der Abbau bis zu 6 Wochen dauern

Dosisbezogener Bereich (Steady State):

250-1770 ng/ml

Fallbeispiel 5

Patienten/Auftrags.-Nr. Geschlecht: **männlich** Geb.: **14.10.1987**
 Diagnose: **F20.0**
stationär

Medikament(e): **Leponex 275 mg/d seit 5 Tagen**
Fevarin 50 mg/d seit 3 Tagen

Seit wann:

Letzte Einnahme: 12h

Begleitmedikamente: **Metformin 100mg/d, Kalinor Btl. 1-0-0**

• **Nichtraucher** **X Raucher (mäßig, < 10 Zig/Tag)** • **R aucher (stark, > 10 Zig/Tag)**

GRUND DER ANFORDERUNG (Zutreffendes bitte ankreuzen, siehe auch Hinweise für Einsender)

- Ersteinstellung • Dosisänderung **X Umstellung der Medikation**
- Nichtansprechen • Compliance-Kontrolle • Nebenwirkung (bitte unten spezifizieren)
- Verlaufskontrolle • anderer Grund (bitte spezifizieren)
- Sonderuntersuchung (bitte spezifizieren)

SCHWEREGRAD DER ERKRANKUNG (nach CGI, siehe Hinweise für Einsender)

- nicht beurteilbar • nicht krank • Grenzfall • leicht krank • mäßig krank
- X deutlich krank** • schwer krank • extrem schwer krank

THERAPIE-EFFEKT (nach CGI, siehe Hinweise für Einsender)

- sehr gut **X mäßig** • gering • unverändert oder verschlechtert • nicht beurteilbar

NEBENWIRKUNGEN (nach UKU): **X keine** • leicht • mittel • schwer

- Schläfrigkeit/Sedierung • Spannung/innere Unruhe • Akkomodationsstörungen
- Hauterscheinungen • Speichelfluss (erhöht/verringert) • Polydipsie
- EPS-Nebenwirkungen (Dystonie/Rigidität/Hypokinese/Akinese) • Tremor • Akathisie
- kardiovaskuläre Störung (orthostatische Dysregulation/Tachykardie)
- gastrointestinale Störungen (Übelkeit/Erbrechen/Nausea/Diarrhoe/Obstipation) • Gewichtszunahme
- urogenitale Störungen (Miktionsstörung/sexuelle Dysfunktion/Polyurie)-
- andere Nebenwirkung (bitte spez.)

Zusammenhang mit dem zu analysierenden Medikament: • wahrscheinlich • möglich • unwahrscheinlich

Datum Behandelnde/r Arzt/ Ärztin

ERGEBNISSE (ng/ ml) und BEURTEILUNG

Blutspiegel: • im therapeutisch üblichen Bereich • zu niedrig • zu hoch
 Empfehlung: Dosis • beibehalten • erhöhen • reduzieren auf mg/Tag

Datum Unterschrift (Labor)

CLZ: 426 ng/ml

NCLZ: 300 ng/ml

Therapeutischer Bereich:

350-600 ng/ml

Dosisbezogener Bereich:

130-370 ng/ml

FLUV: 13 ng/ml

Therapeutischer Bereich:

60-230 ng/ml (Antidepressivum)

Dosisbezogener Bereich:

15-30 ng/ml

Patienten/Auftrags.-Nr. Geschlecht: **männlich** Geb.: **14.10.1987**
 Diagnose: **F20.0**
 stationär

Medikament(e): **Leponex 275 mg/d seit 5 Tagen**
 Fevarin 50 mg/d seit 3 Tagen

Seit wann:

Letzte Einnahme: **12h**

Begleitmedikamente: **Metformin 100mg/d, Kalinor Btl. 1-0-0**

- **Nichtraucher** **X Raucher (mäßig, < 10 Zig/Tag)** • **R aucher (stark, > 10 Zig/Tag)**

GRUND DER ANFORDERUNG (Zutreffendes bitte ankreuzen, siehe auch Hinweise für Einsender)

- Ersteinstellung • Dosisänderung **X** Umstellung der Medikation
- Nichtansprechen • Compliance-Kontrolle • Nebenwirkung (bitte unten spezifizieren)
- Verlaufskontrolle • anderer Grund (bitte spezifizieren)
- Sonderuntersuchung (bitte spezifizieren)

SCHWEREGRAD DER ERKRANKUNG (nach CGI, siehe Hinweise für Einsender)

- nicht beurteilbar • nicht krank • Grenzfall • leicht krank • mäßig krank
- X** deutlich krank • schwer krank • extrem schwer krank

THERAPIE-EFFEKT (nach CGI, siehe Hinweise für Einsender)

- sehr gut **X** mäßig • gering • unverändert oder verschlechtert • nicht beurteilbar

NEBENWIRKUNGEN (nach UKU):

- X** keine • leicht • mittel • schwer

- Schläfrigkeit/Sedierung • Spannung/innere Unruhe • Akkomodationsstörungen
- Hauterscheinungen • Speichelfluss (erhöht/verringert) • Polydipsie
- EPS-Nebenwirkungen (Dystonie/Rigidität/Hypokinese/Akinese) • Tremor • Akathisie
- kardiovaskuläre Störung (orthostatische Dysregulation/Tachykardie)
- gastrointestinale Störungen (Übelkeit/Erbrechen/Nausea/Diarrhoe/Obstipation) • Gewichtszunahme
- urogenitale Störungen (Miktionsstörung/sexuelle Dysfunktion/Polyurie)-
- andere Nebenwirkung (bitte spez.)

Zusammenhang mit dem zu analysierenden Medikament: • wahrscheinlich • möglich • unwahrscheinlich

Datum Behandelnde/r Arzt/ Ärztin

ERGEBNISSE (ng/ ml) und BEURTEILUNG

Blutspiegel: • im therapeutisch üblichen Bereich • zu niedrig • zu hoch
 Empfehlung: Dosis • beibehalten • erhöhen • reduzieren auf mg/Tag

Datum Unterschrift (Labor)

Bezugswert: **200 ng/ml**

Gez. Wert: **100 ng/ml**

Spezifischer Bereich: Spezifischer Bereich

350-600 ng/ml zur Augmentation ist der Spiegel zu hoch für die Dosis.

Dosisbezogener Bereich:

Steady State noch nicht ganz erreicht → Spiegel wird voraussichtlich noch etwas ansteigen

Dosis vorerst beibehalten und erneute Spiegelkontrolle unter gesicherten Steady State Bedingungen (6-10 Tage unter

Therapeutischer Bereich:

Fluvoxamin: (Antidepressivum)

Spiegel ausreichend zur Augmentation, aber etwas niedrig für die Dosis

Steady State erst nach 4-6 Tagen bei konstanter Dosis erreicht

Spiegel wird voraussichtlich noch etwas ansteigen mit Verstärkung des Augmentationseffekts

Ende

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

10.05.2012

Fragen???